

Х Е Р Б И Ц И Д И

№	Продукт, Производител	Активно вещество	Доза/дка (концентрация)	Култура, вредител и моменти на приложение на продукта	ЛД 50 орал но за плъх	Кар- ант. срок в дни	Кatego- рия за упот- реба
1.	АГРОКСОН НюФарм -Удостоверение № 0551/30.01.2009 г.	500 г/л МЦПА	200 мл/дка	срещу широколистни плевели при: пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите	700	-	2
2.	АЖИЛ 100 ЕК Мактешим Аган -Удостоверение № 99/21.01.2004 г.	100 г/л пропаквизафоп+ сърфактант	50 мл/дка	срещу едногодишни житни плевели при: маслодайна рапица - срещу едного- дишни житни плевели и самосевки от житни култури, внесен във фаза 3-5 лист на плевелите и самосевките	>5000	60	2
			80 мл/дка	соя, памук, слънчоглед, захарно цвекло, домати, пипер, лук			
			80 мл/дка	срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: слънчоглед, зах.цвекло, тикви, пъпеши			
			100 мл/дка	соя			
			150 мл/дка	памук, домати, пипер, лук			
			150-200 мл/дка	ягоди, малини - във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
3.	АКОРД Хеймонт Корпорейшън -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата	880 г/л ацетохлор	200-250 мл/дка	срещу едногодишни житни в т.ч. балур от семе и някои широколистни и плевели при: слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата	>2000	-	3

	на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 259/23.03.2005 г.						
4.	АКСИАЛ 050 ЕК Синджента	50 г/л пиноксаден	60-90 мл/дка	срещу едногодишни житни плевели в т. ч. див овес при: пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културата и от фаза 2-3 лист до фаза братене на плевелите		-	2
5.	АКУРАТ 60 ВГ Хеминова	600 г/кг метсулфурон - метил	1 г/дка	срещу едногодишни широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница и ечемик - внася се след 3 лист до края на братене на културата. Забележка: В предложената доза продуктът не контролира лепка и паламида	5000	-	3
6.	АЛАЙ МАКС ДюПонт ИО	143 г/кг метсулфурон-метил+143 г/кг трибенурон-метил	3,5 г/дка	срещу широколистни плевели при: пшеница и ечемик - внася се във фаза 2-3 лист най-късно до началото на вретенене на културите	5000	-	3
7.	АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ Рокита Агро -Удостоверение № 010019-ПРЗ/ 05.11.2009 г.	600 г/л 2,4 Д ам.сол	120 мл/дка	срещу широколистни плевели при: царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата	375	-	3
			150-200 мл/дка	пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите			

8.	АМИНОПИЕЛИК Д Рокита Агро -Краен срок за предлагане на пазара - 16.09.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 16.09.2010 г. -Удостоверение № 138/02.02.2004 г.	36 % 2,4 Д+ 2,8 % дикамба	300 мл/дка	срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница - внася се във фаза братене на културата	375 1700	30	3
9.	АРАМО 50 БАСФ -Удостоверение № 509/18.09.2007 г.	50 г/л тепралоксидим+ 500 г/л метилолеат (масло)	100 мл/дка	срещу едногодишни житни плевели при: слънчоглед, соя, фасул, грах, люцерна	>5000	35 грах	3
	срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:		60 фасул слън чо- глед соя				
160 мл/дка с 15-20 л/дка раб. р-р	слънчоглед - внася се при височина 20-30 см - балур; 15-20 см - пирей; 10-15 см - трескот						
200 мл/дка	соя, фасул, грах, люцерна - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)						
10.	АРАТ БАСФ -Удостоверение № 332/25.01.2006 г. +ДЕШ			500 г/л дикамба+ 250 г/л тритосулфурон аджувант ДЕШ ХЦ	10-20 г/дка	срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите	5000 1700
10-20 г/дка+ 50 мл/дка ДЕШ	пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите и 3-5 лист на плевелите						
20 г/дка+ 100 мл/дка ДЕШ	царевица - внася се във фаза 2-6 лист на плевелите						

11.	АРОУ 120 ЕК Мактешим Аган -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 84/07.06.2004 г.	120 г/л клетодим+ прилепител	80 мл/дка	срещу едногодишни житни плевели при: слънчоглед, картофи	1360	-	3
			160 мл/дка	срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: слънчоглед, картофи - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
12.	АРОУ 240 ЕК Мактешим Аган -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 85/07.05.2004 г.	240 г/л клетодим	40 мл/дка	срещу едногодишни житни плевели при: слънчоглед	1360	-	3
			80 мл/дка	срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: слънчоглед - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура) Забележка: Прилага се с прилепител (масло) в доза 0,05 %			
13.	АУРА ПЛЮС БАСФ СЕ -Удостоверение № 265/12.04.2005 г.	75 г/л профоксидим+ 300 г/л аджувант	150-200 мл/дка	срещу едногодишни житни плевели в т.ч. кокоши проса при: ориз - внася се във фаза 2-4 лист на културата, при източена вода.	5000	-	3
14.	АФАЛОН 45 СК Мактешим Аган -Удостоверение № 241/22.12.2004 г.	450 г/л линурон	100-150 мл/дка	срещу едногодишни широколистни плевели при: лук - внася се във фаза 3 лист на културата и ранни фази на плевелите	4000	60	2
			300 мл/дка	слънчоглед			
			300-400 мл/дка	соя - внася се след сеитба, преди поникване при соя и слънчоглед			

15.	АЦЕНИТ 50 ЕК Имаспро -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 161/16.02.2004 г.	500 г/л ацетохлор	300-400 мл/дка	срещу едногодишни житни в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели при: слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата	2148	-	2
16.	АЦЕНИТ ГОЛД 84 ЕК Имаспро -Удостоверение № 347/17.03.2006 г. ХЕРБАЦИД 84 ЕК -Удостоверение № 381/07.11.2006 г. -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.	840 г/л ацетохлор	200-250 мл/дка 200-300 мл/дка	срещу едногодишни житни в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели при: слънчоглед царевича, памук - внася се след сеитба, преди поникване на културите	2148	-	2
17.	АЦЕТАГАРД® 880 ЕК Агрива АД -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 34/05.01.2003 г.	880 г/л ацетохлор+ антидот	200-250 мл/дка	срещу едногодишни житни в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели при: царевича - внася се след сеитба, преди поникване на културата	2148	-	2

18.	БАЗАГРАН 480 СЛ БАСФ -Удостоверение № 512/18.09.2007 г.	480 г/л бентазон	100-150 мл/дка	срещу едногодишни широколистни плевели при: градински грах за семепроизводство	>1000	30	3
			180 мл/дка	копър, резене, хизоп			
			200 мл/дка	лук и чесън			
			250 мл/дка	фасул и грах - полско производство			
			200-300 мл/дка	соя, лен			
			250-300 мл/дка	люцерна - млада			
			300-400 мл/дка	фъстъци			
			400 мл/дка	ориз - внася се във фаза 2-4 лист на плевелите и 2-4 лист (трилистник) на културите и 5-8 см височина на лена			
19.	БАЗАГРАН 600 СЛ БАСФ -Краен срок за предлагане на пазара - 16.09.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 16.09.2010 г. -Удостоверение № 165/16.02.2004 г.	600 г/л бентазон	150 мл/дка	срещу едногодишни широколистни плевели при: фасул, грах, лук (I-ва год.), чесън	>1000	30	3
			150-200 мл/дка	лук (II-ра и III-та год.)			
			200 мл/дка	царевица, лен, люцерна-млада, соя			
			250 мл/дка	фъстъци			
			300 мл/дка	ориз - внася се във фаза 2-4 лист на плевелите и 2-4 лист (трилистник) на културите и 5-8 см височина на лена			
20.	БАЗАМИД ГРАНУЛАТ Канешо Сойл Тритмънт -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 144/05.02.2004 г.	980 г/кг дазамет	10-20 г/кв.м.	срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: тютюн (разсад) - внася се 10-15 дни преди засяване с инкорпориране, след което се покрива с полиетилен	520	-	1

21.	БАЗИС 75 ДФ ДюПонт ИО -Удостоверение № 0531/20.10.2008 г.	500 г/кг римсулфурон+ 250 г /кг тифенсулфурон	2-2,5 г/дка	срещу едногодишни и многогодишни житни и едногодишни широколистни плевели при: царевича - внася се във фаза 2-4 лист на плевелите, 20-25 см височина на балура и до 6-ти лист на културата. Прилага се с прилепител Тренд - 0,1 %.	>5000	30	3
22.	БАСТА 15 СЛ Байер Кропсайанс -Удостоверение № 261/10.01.2005 г.	150 г/л глюфозинат амониум	500-600 мл/дка	срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: овощни градини, лозя - внася се в активна вегетация на плевелите	2000	14	3
23.	БЕТОКСОН П 65 Оксон -Удостоверение № 382/17.03.2006 г.	650 г/кг хлоридазон	400 г/дка	срещу едногодишни широколистни плевели при: захарно цвекло - внася се преди сеитба с инкорпориране Забележка: да се прилага само всяка трета година на една и съща площ	3830	-	3
24.	БИТЪП КОМПАКТ Юнайтед Фосфоръс -Удостоверение № 71/21.07.2003 г.	82,5 г/л фенмедифам+ 82,5 г/л десмедифам	600 мл/дка 300+300 мл/дка	срещу едногодишни широколистни плевели при: захарно цвекло - внася се след 1-ви чифт същински листа на културата и от котиледони до 2-4 лист на плевелите, или захарно цвекло - двукратно: I-во трети- ране след 1-ви чифт същински листа на културата и от котиледони до 2-4 лист на плевелите; II-ро 7-10 дни след първото	>2000	30	3
25.	БРОМОТРИЛ 24 ЕК Мактешим Аган	240 г/л бромоксинил октаноат		срещу широколистни в т.ч. слабочувс- тителни на хормоноподобните херби- циди плевели при:	190	-	2

	-Краен срок за предлагане на пазара - 16.09.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 16.09.2010 г. -Удостоверение № 103/21.01.2004 г.		200 мл/дка	пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите			
26.	БУТИЗАН 400 СК БАСФ -Удостоверение № 523/05.03.2008 г.	400 г/л метазахлор	250 мл/дка	срещу едногодишни широколистни и житни плевели зеле - внася се след разсаждане на зелето до 2 лист на плевелите; зелев разсад (лехи) - внася се след сеитба, преди поникване; рапица - след сеитба, преди поникване или вегетационно до 2 лист на плевелите	2150	70	3
27.	БУТИЗАН S БАСФ -Удостоверение № 168/10.03.2004 г.	500 г/л метазахлор	150 мл/дка	срещу едногодишни широколистни и житни плевели при: тютюн - внася се след вкореняване на растенията	2150	70	3
			200 мл/дка	праз - внася се във фаза 2-4 лист на плевелите			
			200 мл/дка	зеле - внася се 8-10 дни след разсаждане			
			200 мл/дка	фуражна рапица - внася се след сеитба, преди поникване на културата			
28.	ВАЛСАГАРД Стоктон Кемикъл -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 197/19.01.2005 г.	880 г/л ацетохлор	200-250 мл/дка	срещу едногодишни житни в т.ч. балур от семе и широколистни плевели при: слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата	>2000	-	2

29.	ВАЛСАГЛИФ Стоктон Кемикъл -Удостоверение № 153/04.01.2005 г.	360 г/л глифозат	600 мл/дка	срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: лозя - внася се в активна вегетация на плевелите (20-30 см височина) Заб.: прилага се с 10-20 л/дка раб. р-р	>2000	30	3
30.	ВАЛСАМИН Стоктон Кемикъл -Удостоверение № 154/04.01.2005 г.	600 г/л 2,4 Д ам.сол	150 мл/дка	срещу широколистни плевели при: пшеница - внася се във фаза братене на културата	1200	-	3
31.	ВЕНЗАР 80 ВП ДюПонт ИО -Краен срок за предлагане на пазара - 16.09.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 16.09.2010 г. -Удостоверение № 0544/20.10.2008 г.	800 г/кг ленацил	80-100 г/дка	срещу едногодишни широколистни плевели при: захарно цвекло - внася се преди сеитба с инкорпориране, или след сеитба, преди поникване на културата	11000	-	3
			150 г/дка	ягоди - внася се рано напролет, преди поникване на плевелите			
32.	ВЕНТУМ ВГ Байер КропСайанс -Удостоверение № 548/05.03.2008 г.	300 г/кг форамсулфурон+ 10 г/кг йодосулфурон- метил-натрий+ антидот	10-15 г/дка+ 200 мл/дка Метро (прилепител)	срещу едногодишни житни и широколистни плевели в т. ч. балур от семе и коренища и други многогодишни (паламида, пирей) при: царевича - внася се от 2-6 лист на културата, от котиледони до 6 лист на едногодишните широколистни плевели и 15-25 см височина на балура	>5000	-	3
33.	ВИКТУС 4 СК ДюПонт ИО -Удостоверение № 0574/14.10.2008 г. КЕЛВИН ТОП -Удостоверение № 0577/02.12.2008 г.	43 г/л никосулфурон	125 мл/дка	срещу едногодишни и многогодишни житни, вкл. балур от коренища и някои широколистни плевели (шир, синап, просфорник) при: царевича - внася се във фаза до 8 лист на културата, 15 см височина на балура и 2-4 лист на широколистните плевели	>5000	-	3

34.	ГАЛИГАН 240 ЕК Мактешим Аган -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 278/24.01.2005 г.	240 г/л оксифлуорфен	80-100 мл/дка	срещу едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели при: слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата	5000	45	3
			150 мл/дка	лук II-ра год. - внася се трикратно (50+50+50 мл/дка), през 7 дни като: I-во третиране - се във фаза 3-4 лист на културата и ранни фази от развитето на плевелите. Заб.: възможна е проява на фитотоксичност, която в следствие се преодолява			
35.	ГАРДИАН Монсанто -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 238/20.12.2004 г.	840 г/л ацетохлор+ антидот	200-250 мл	срещу едногодишни житни в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели при: слънчоглед	2148	-	2
			200-300 мл/дка	соя, царевица, фъстъци			
			300 мл/дка	памук - внася се след сеитба, преди поникване на културите			
36.	ГАРДИАН МАКС Монсанто -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 138/20.12.2004 г.	840 г/л ацетохлор+ 28 г/л антидот (фуриразол)	200-250 мл/дка	срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: слънчоглед	2148	-	2
			200-300 мл/дка	царевица			
			300 мл/дка	памук - внася се след сеитба, преди поникване на културите			
37.	ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СК Синджента	312,5 г/л s-метолахлор+ 187,5 г/л тербутилазин	350 мл/дка	срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване	>2000	-	2
						60 за	

	-Красен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Красен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 0592/06.04.2009 г.		400-450 мл/дка	царевица - внася се след сеитба, преди поникване или след поникване на културата до 1-2 лист на житните плевели.		фураж	
38.	ГЛИН 75 ДФ ДюПонт ИО -Удостоверение № 537/20.10.2008 г.	750 г/кг хлорсулфурон	1-1,5 г/дка	срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница и ечемик - внася се след фаза 3-ти лист на културите; лен -внася се във фаза елхичка на културата	5545	60	3
			2-2,5 г/дка	пшеница - внася се след сеитба, преди поникване на културата			
			5 г/дка	срещу орлова папрат при: ливади и пасища - внася се в активен растеж на папратта Заб.: да се използва на площи за монокултурно отглеждане на пшеница и ечемик			
39.	ГЛИФОГАН 480 СЛ Мактешим Аган -Удостоверение № 229/17.11.2004 г.	360 г/л глифозат	400-1200 мл/дка	срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: овощни градини, лозя, свободни площи (стърница)	5600	30	3
			1200 мл/дка	ж.п.линни - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели			
40.	ГЛИФОЗАТ-И Аустриал /И Пи Чи/	360 г/л глифозат	400-1200 мл/дка	срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: овощни градини, лозя, свободни площи (стърница) - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели	5600	30	3

41.	ГЛИФОС 36 СЛ Хеминова -Удостоверение № 531/14.01.2007 г.	360 г/л глифозат	400-1200 мл/дка	срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища)	5600	30	3
			1200 мл/дка	ж.п.линии - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели			
42.	ГЛИФОС СУПЕР 45 СЛ Хеминова	450 г/л глифозат	320-960 мл/дка	срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: свободни площи (стърнища)	5600	30	3
			960 мл/дка	ж.п.линии - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели			
43.	ГОАЛ 2 Е Дау Агросайънсис -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 244/04.01.2005 г.	240 г/л оксифлуорфен	80 мл/дка	срещу едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели при: слънчоглед - внася се вегетационно за културата и фаза 2-4 лист на плевелите	5000	45	3
			80-100 мл/дка	слънчоглед - след сеитба, преди поникване			
			100 мл/дка	соя, фъстъци, памук - внася се след сеитба, преди поникване на културите; домати и пипер (разсадни), тютюн - внася се преди разсаждане;			
			100-150 мл/дка	ориз (срещу кандри) - внася се във фаза 2-4 лист на плевелите			
			100-200 мл/дка	лук I-ва год. - внася се след сеитба, преди поникване на културата лук (едногодишен за глави) - внася се след фаза 3-4 лист на културата			
			150 мл/дка	бор (бял и черен) и смърч (семенилища I-ва год.) - внася се 6 седмици след поникването лук II год. - внася се след засаждане, преди поникване на културата зеле - внася се преди разсаждане			

			150-200 мл/дка	овощни градини, лозя - внася се вегетационно (април-май)			
			200 мл/дка	розмарин - внася се през невегетационния период на културата			
			200-300 мл/дка	овощни разсадници - внася се рано напролет, преди поникване на плевелите			
			200-400 мл/дка	бор (бял и черен) и смърч (II, III годишни семенилища и школи) - внася се преди или по време на вегетацията (юни-юли) малини - внася се рано напролет, преди вегетацията на културата и непоникнали плевели			
			350 мл/дка	градински чай - внася се рано напролет, преди вегетацията Забележка: при слънчоглед и памук е възможна проява на фитотоксичност, която в последствие се преодолява			
44.	ГОАЛ 4 Ф Дау Агросайънсис -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 364/29.06.2006 г.	480 г/л оксифлуорфен	40 мл/дка	Срещу едногодишни и някои многогодишни широколистни при: слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата	5000	45	3
			40-50 мл/дка	слънчоглед - внася се вегетационно за културата и фаза 2-4 лист на плевелите. Забележка: При вегетационно третиране се наблюдава фитотоксичност, която се преодолява			
			75 мл/дка	лук - I, II год. - внася се след сеитба (засаждане), преди поникване на културата			

45.	ГРАНСТАР 75 ДФ /ТРИМЕР 75 ДФ/ ДюПонт ИО -Удостоверение № 568/14.10.2008 г.	750 г/кг трибенурон	1-1,5 г/дка	срещу едногодишни широколистни в т. ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница и ечемик - внася се във фаза 2-4 лист на плевелите; -при необходимост се комбинира с 2,4 Д ам.сол	5000	30	3
46.	ГРАСП 25 СК Синджента Удостоверение № 555/06.04.2009 г.	250 г/л тралкоксидим	100-120 мл/дка	срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при: пшеница и ечемик - внася се от 3 лист до края на братене на дивия овес, рано напролет в начало на трайна вегетация на културите. Заб.: прилага се с Атплюс 463 в доза 100-120 мл/дка	1258	30	3
47.	ДЕВРИНОЛ 4 Ф Юнайтед Фосфоръс	450г/л напропамид	300-350 мл/дка	срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: фуражна рапица - внася се преди сеитба с плитко инкорпориране	5000	45	3
			300-400 мл/дка	тютюн (лехи) - внася се преди сеитба с плитко инкорпориране			
			400 мл/дка	тютюн - внася се преди разсаждане; сливи - внася се преди вегетацията с инкорпориране; шипки (разсад) - внася се преди сеитба с плитко инкорпориране; лавандулов разсад - внася се след сеитба, преди поникване на културата			
			400-500 мл/дка	зеле - внася се преди разсаждане; домати и пипер (безразсадни) - внася се преди сеитба с плитко инкорпориране Забележка: третираните с Девринол площи да не се засяват с житни култури			

48.	ДЕЗОРМОН ЛИКИД Ню Фарм	600 г/л 2,4 Д ам.сол	120 мл/дка 150-200 мл/дка	срещу широколистни плевели при: царевница - внася се във фаза 3-5 лист на културата пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите	375	-	3
49.	ДЕНКОР 70 ВДГ Юнайтед фосфоръс -Красен срок за предлагане на пазара - 16.09.2009 г. -Красен срок за употребата на наличните количества - 16.09.2010 г.	700 г/кг метрибузин	70-80 г/дка	срещу едногодишни широколистни плевели при: картофи - внася се след засаждане, преди поникване на културата	2000	30	3
50.	ДЕРБИ СУПЕР Дау АгроСайънсис -Удостоверение № 540/18.10.2007 г.	150,2 г/кг флорасулам+ 300,5 г/кг аминопиралид- калий	2,5; 3,3 г/дка	срещу широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница - внася се във фаза братене на културата. Забележка: високата доза се прилага при преобладаващо заплевеляване с паламида		-	3
51.	ДИКОПУР Ф Ню Фарм -Удостоверение № 202/06.10.2004 г.	600 г/л 2,4 Д ам.сол	120 мл/дка	срещу широколистни плевели при: царевница - във фаза 3-5 лист на културата	375		3
			150-200 мл/дка	пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите			
52.	ДИОВИД 60 СЛ Юнайтед Фосфоръс -Удостоверение № 170/10.03.2004 г.	600 г/л 2,4 Д ам.сол	120 мл/дка	срещу широколистни плевели при: царевница - внася се във фаза 3-5 лист на културата	375	-	3
			150-200 мл/дка	пшеница - във фаза братене на културата			
53.	ДИФЕНДЪР СЛ Ню Фарм -Удостоверение №	360 г/л 2,4 Д+ 120 г/л дикамба		срещу широколистни в т. ч. слабо- чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:	1276	-	3
	277/06.07.2005 г.		80-100 мл/дка	пшеница - внася се във фаза братене на			

				културата			
			120 мл/дка	царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата			
54.	ДОМИНАТОР 360 СЛ Дау Агросайънсис -Удостоверение № 214/20.10.2004 г.	360 г/л глифозат	400-1200 мл/дка	срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: овощни градини, лозя	5600	30	3
			1200 мл/дка	ж.п.линии -внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели			
55.	ДОМИНАТОР УЛТРА Дау Агросайънсис -Удостоверение № 356/20.04.2006 г.	360 г/л глифозат	300 мл/дка с 20-30 л/дка раб. р-р	срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: лозя - внася се по време на вегетация с насочено пръскане	5600	30	3
56.	ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК Синджента -Удостоверение № 010012-ПРЗ/ 12.10.2009 г.	960 г/л s-метолахлор	120 мл/дка	срещу едногодишни житни в т. ч. балур от семе и някои широколистни плевели при: домати и пипер - разсадни и безразсадни, моркови, лук I, II, III година	2080	-	3
			150 мл/дка	царевица, слънчоглед, соя, захарно цвекло, тютюн, памук, картофи, фасул, люцерна - внася се след сеитба (засаждане), преди поникване или преди засаждане на културите Забележка: при лук I-ва година да се прилага само на средно тежки и тежки почви			
57.	ЕКИП ОД	22,5 г/л		срещу кокошо просо, разслан шир,	>5000	-	3

	Байер Кропсайанс	форамсулфурон+ 22,5 г/л антидот	200-250 мл/дка	обикновен щир, овчарска торбичка, бяла куча лобода, татул, пача трева, обикновено пипериче, черно куче грозде при: царевница - внася се във фаза 3-6 лист на чувствителните плевели			
58.	ЕКИП СК Байер Кропсайанс -Удостоверение № 39/05.01.2003 г.	22,5 г/л форамсулфурон+ 22,5 г/л антидот	200-250 мл	срещу едногодишни житни и широколистни плевели в т.ч. балур от семе и коренища при: царевница - внася се във фаза 2-8 лист на културата, от котиледони до 6 лист на едногодишните широколистни плевели и 15-25 см височина на балура	>5000	-	3
59.	ЕКЛИПС 700 ВДГ Мактешим Аган -Удостоверение № 341/13.03.2006 г.	700 г/кг метрибузин	70 г/дка	срещу едногодишни широколистни плевели при: домати - внася се преди разсаждане на културата картофи - внася се след засаждане, преди поникване на културата	2000	30	3
60.	ЕКОПАРТ 2 СК Нихон Нояку -Удостоверение № 218/25.10.2004 г.	20 г/л пирафлуфен- етил	45-60 мл/дка	срещу едногодишни широколистни плевели при: пшеница - внася се след 3 лист на културата и 2-4 лист на плевелите	>5000	60	3
61.	ЕКСПРЕС 50 СГ ДюПонт ЮО	500 г/кг трибенурон	4 г/дка с 20-30 л/дка раб. р-р	срещу широколистни плевели при: слънчоглед - хибриди на Пионер (устойчиви на Експрес 50 СГ) - внася се във фаза 2-6 лист на плевелите	5000	30	3
62.	ЕСКОРТ ЕК БАСФ Агро Б.В. -Удостоверение № 82/23.03.2003 г.	12,5 г/л имазамокс+ 250 г/л пендиметалин	300 мл/дка	срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: фасул - внася се във фаза 1 чифт същински листа (трилистници) на културата	3535	30	3
			400 мл/дка	царевница (IR - хибриди - устойчиви на			

				имидазолини) - внася се във фаза 2-3 лист на културата. Забележка: да се спазват указанията на производителя за следващите в сеитбооборота култури			
63.	ЕФАЗАТ 36 СЛ /ГЛИФЪП 36 СЛ/ Ефтимиадис -Удостоверение № 272/20.01.2005 г.	360 г/л глифозат а.в. Монсанто	400-1200 мл/дка	срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: лозя - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели	5600	30	3
64.	ЗЕНКОР 70 ВГ Байер Кропсайанс	700 г/кг метрибузин	50 г/дка	срещу едногодишни широколистни плевели при: домати (безразсадни) - внася се във фаза 1 цветна китка на културата	2000	30	3
			60-70 г/дка	домати (разсадни) - внася се във фаза 1 цветна китка на културата; картофи - внася се при височина 5-10 см на културата			
			70 г/дка	домати (разсадни) - преди засаждане			
			70-80 г/дка	картофи - внася се след засаждане, преди поникване на културата			
			100 г/дка	люцерна (стара) - внася се преди вегетацията на културата			
65.	ЗИНО 70 ВП Имаспро -Краен срок за предлагане на пазара - 31.01.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества -	700 г/кг метрибузин	50 г/дка 60-80 г/дка	срещу едногодишни широколистни плевели в т.ч. пълзящ щир при: царевица - внася се чрез насочено пръскане и ниско налягане картофи - внася се след засаждане, преди поникване на културата	2000	30	3
	31.01.2010 г.		100 г/дка	люцерна (стара) - внася се преди веге-			

	-Удостоверение № 248/17.03.2006 г.			тацията на културата (10 март-20 април) Заб.: при по-късно внасяне се наблюдава фитотоксичност, която се преодолява			
66.	ИГЪЛ 75 ДФ ДюПонт ИО -Удостоверение № 535/20.10.2008 г.	750 г/кг хлорсулфурон	1-1,5 г/дка	срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница и ечемик - внася се след фаза 3 лист на културите	5545	60	3
			2-2,5 г/дка	пшеница - внася се след сеитба, преди поникване на културата. Забележка: да се прилага на площи за монокултурно отглеждане на пшеница и ечемик			
67.	ИЗОР 500 СК Ариста Лайфсайнс -Удостоверение № 349/01.12.2005 г.	500 г/л изопротурон	350 мл/дка	срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: пшеница и ечемик - внася се след 3 лист на културите	3600	45	3
			400-500 мл/дка	пшеница и ечемик - внася се след сеитба, преди поникване на културите			
68.	ИМПЕРИЯ 4 СК /КРЮ 4 СК/ НюФарм САС -Удостоверение № 561/09.09.2008 г.	40 г/л никосулфурон	125 мл/дка	срещу едногодишни житни, балур от кореница и някои широколистни плевели при: царевица - внася се във фаза 2-4 лист на балура и до 8 лист на културата	5000		3
69.	КАЛАМ+ДЕШ БАСФ -Удостоверение № 0588/27.03.2009 г.	125 г/кг тритосулфурон+ 600 г/кг дикамба +аджувант ДЕШ ХЦ	20 г+100 мл/дка 30 г+100 мл/дка 40 г+100 мл/дка	срещу широколистни плевели при: царевица - внася се във фаза 2-6 лист на плевелите. Дозата се избира според фазата на развитие на плевелите, като най-високата се препърчва в по-напреднали фази и преобладаващо заплевеляване от разстлан шир и черно куче грозде	5000 1700		
70.	КАЛИН ФЛО	425 г/л линурон		срещу едногодишни широколистни	4000	60	2

	Ариста Лайфсайънс -Удостоверение № 347/01.12.2005 г.		150-200 мл/дка 200-250 мл/дка 250-300 мл/дка	плевели при: моркови, кориандър картофи слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културите			
71.	КАЛИСТО 480 СК Синджента -Удостоверение № 0593/06.04.2009 г. АТПЛЮС	480 г/л мезотрион прилепител	20 мл/дка 30-40 мл/дка	срещу едногодишни житни и широко- листни плевели при: царевица - внася се вегетационно за културата и ранни фази на плевелите Забележка: прилага се с Атплюс - 0,5 % царевица - внася се след сеитба, преди поникване на културата	4000	60	2
72.	КАМБИО СЛ БАСФ -Удостоверение № 240/25.02.2005 г.	320 г/л бентазон+ 90 г/л дикамба	125 мл/дка 200 мл/дка	срещу широколистни плевели при: пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата и плевелите	1700	-	3
73.	КАСОРОН Г Кемтура -Краен срок за предлагане на пазара - 18.03.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 18.03.2010 г. -Удостоверение № 172/10.03.2004 г.	67,5 г/кг дихлобенил	3 кг/дка 6-8 кг/дка 8-10 кг/дка	срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: лавандула (над 3 години) малини, рози касис, овощни градини, лозя - внася се рано напролет, извън вегета- ционния период на културите	3160		3
74.	КЛИК 50 СК Оксон -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.	500 г/л тербутилазин	200-250 мл/дка	срещу едногодишни житни и широко- листни плевели при: царевица - след сеитба, преди поникване на културата	2000	-	2
	-Краен срок за употребата						

	на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 362/18.05.2006 г.						
75.	КОРДУС 75 ВГ ДюПонт ИО -Удостоверение № 565/14.10.2008 г.	500 г/кг никосулфурон+ 250 г/кг римсулфурон		срещу едногодишни и многогодишни житни плевели вкл. балур от коренища и някои широколистни плевели (абутилон, обикновен щир и синап) при:	>5000	30	3
			4 г/дка+0,1% Тренд (с 20-30 л/дка раб. р-р)	царевица - внася се във фаза до 8 лист на културата, 15 см височина на балура и 2-4 лист на широколистните плевели.			
76.	КОРИДА 75 ВДГ ГАТ Макроенкапсю- лейшън АГ - Австрия -Удостоверение № 11/23.11.2003 г.	750 г/кг трибенурон ГАТ Макроенкап- слюлейшън АГ - Австрия	1,5 г/дка	срещу едногодишни широколистни в т. ч. слабочувствителни на гормо- ноподобните хербициди плевели при: пшеница - внася се след фаза 3 лист на културата и 2-4 лист на плевелите	>5000	-	3
77.	КОСМИК Ариста Лайфсайънс -Удостоверение № 323/09.01.2006 г.	360 г/л глифозат	400-1200 мл/дка	срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: лозя и овощни градини	5600	30	3
			1200 мл/дка	ж.п.линии - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели			
78.	КОТОЛИНТ 500 СК Ню Фарм -Красен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Красен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.	500 г/л флуометурон	400 мл/дка	срещу едногодишни широколистни плевели при: памук - след сеитба, преди поникване на културата	>5000	-	3
79.	КОТОНЕКС 50 ВП	500 г/кг		срещу едногодишни широколистни	>5000	-	3

	Мактешим Аган -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 104/21.01.2004 г.	флуометурон	400 мл/дка	плевели при: памук - внася се след сеитба, преди поникване на културата			
80.	КОТОНЕКС 50 СК Мактешим Аган -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 354/06.01.2006 г.	500 г/л флуометурон	400 мл/дка	срещу едногодишни широколистни плевели при: памук - внася се след сеитба, преди поникване на културата	>5000		3
81.	ЛАРЕН 20 СГ ДюПонт ИО -Удостоверение № 570/14.10.2008 г.	200 г/кг метсулфурон-метил	3 г/дка	срещу едногодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели вкл. лепка при: пшеница и ечемик - внася се след 3 лист на културата и ранни фази на плевелите	>5000	-	3
82.	ЛАРЕН 60 ВГ ДюПонт ИО -Краен срок за предлагане на пазара - 14.02.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 14.02.2011 г. -Удостоверение № 528/12.07.2007 г.	600 г/кг метсулфурон-метил	1 г/дка	срещу едногодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели вкл. лепка при: пшеница и ечемик - внася се след 3 лист на културата до 2-ри стъблен възел	>5000	-	3
83.	ЛАУДИС ОД	44 г/л		срещу едногодишни и многогодишни	>5000	140	3

	Байер Кропсайанс -Удостоверение № 0581/27.01.2009 г.	темботрион+ 22 г/л изоксадифен-етил (антидот)	200 мл/дка	житни и широколистни плевели вкл. балур от семе и коренища при: царевница - внася се във фаза 2-8 лист на културата и до 6-ти лист на плевелите и височина на балура 15-25 см			
84.	ЛЕОПАРД 5 ЕК Мактешим Аган -Удостоверение № 254/07.01.2005 г.	50 г/л квизалафоп-П- етил	150 мл/дка	срещу едногодишни житни плевели при: слънчоглед, захарно цвекло, тютюн, соя, домати, картофи	1210	60	3
			200 мл/дка	срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: слънчоглед, захарно цвекло, тютюн, домати, картофи, соя - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
85.	ЛИНТУР 70 ВГ Синджента -Удостоверение № 0556/06.04.2009 г.	4,1 % триасулфурон+ 65,9 % дикамба	15 г/дка	срещу широколистни в т.ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница и ечемик - внася се от 3 лист до края на братене на културите и 2-4 лист на плевелите	>2000	-	3
86.	ЛИНУРЕКС 45 СК Мактешим Аган -Удостоверение № 142/22.12.2004 г.	450 г/л линурон	200 мл/дка	срещу едногодишни широколистни плевели при: кориандър	4000	60	2
			300 мл/дка	слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културите			
87.	ЛИНУРЕКС 50 ВП Мактешим Аган	500 г/кг линурон	150 г/дка	срещу едногодишни широколистни плевели при: лук - внася се във фаза 2-3 лист на културата	4000	60	2
			150-200 г/дка	моркови - внася се след сеитба, преди			

				поникване или вегетационно от 1 същински лист до 2 месеца преди прибиране на културата			
			200 г/дка	картофи - внася се след засаждане, преди поникване на културата			
			300 г/дка	соя, слънчоглед, фасул - внася се след сеитба, преди поникване на културите			
88.	ЛИНУРЕКС 50 СК Мактешим Аган -Удостоверение № 174/10.03.2004 г.	500 г/л линурон	150-200 мл/дка	срещу едногодишни широколистни плевели при: кориандър	4000	60	2
			200-250 мл/дка	картофи			
			250-300 мл/дка	слънчоглед, соя - внася се след сеитба, преди поникване на културите			
89.	ЛИНУРОН 45 СК НоваФито -Удостоверение № 161/06.01.2005 г.	450 г/л линурон	200 мл/дка	срещу едногодишни широколистни плевели при: кориандър	4000	90	2
			250-300 мл/дка	слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културите			
90.	ЛОГОС 4 СК Форвард -Удостоверение № 15/23.01.2003 г.	40 г/л никосулфурон	125 мл/дка	срещу едногодишни житни, някои широколистни плевели и балур от коренища и при: царевица - внася се във фаза 2-4 лист на балура и до 8 лист на културата	5000		3
91.	ЛОНТРЕЛ 300 ЕК Дау Агросайънсис -Удостоверение № 245/05.01.2005 г.	300 г/л клопиралид	30-40 мл/дка	срещу широколистни плевели (паламида, лайка, лепка, млечок, подрумче и др.) при: ягоди - внася се след беритба на плодовете	4300		3
			30-50 мл/дка	цвекло, лен - внася се през вегетацията на културите (фаза "елхичка" на лена) и ранни фази на плевелите			
			40-50 мл/дка	пшеница - във фаза братене на културата;			

				лук (за глави) - внася се във фаза "камшиче" на културата			
92.	ЛОТУС Д НюФарм -Краен срок за предлагане на пазара - 30.10.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 30.10.2010 г. -Удостоверение № 175/10.03.2004 г.	50 г/л цинидон-етил+ 420 г/л 2,4 Д	75-100 мл/дка	срещу широколистни в т.ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите	>200	-	3
93.	ЛУМАКС 538 СК Синджента -Удостоверение № 225/01.02.2005 г. -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.	375 г/л s-метолахлор+ 125 г/л тербутилазин+ 37,5 г/л мезотрион	300 мл/дка	срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: царевича - внася се вегетационно за културата и ранни фази на плевелите (2-3 лист), или	>2000	-	2
			300-400 мл/дка	царевича - внася се след сеитба, преди поникване на културата			
94.	МАЙСТЕР ОД Байер Кропсайанс -Удостоверение № 351/22.03.2006 г.	30 г/л форам-сулфурон+ 1 г/л йодосулфурон+ 30 г/л изоксадифенетил	120; 150 мл/дка	срещу едногодишни житни и широколистни плевели, вкл. балур от семе и коренища при: царевича - внася се във фаза 3-8 лист на културата, от котиледони до 6 лист на едногодишните плевели и 15-25 см височина на балура Забележка: по-високата доза се използва при преобладаващо заплевеляване с балур	>5000	-	3
95.	МАТОН 600 ЕК	600 г/л 2,4 Д		срещу широколистни плевели при:	375		3

	НюФарм -Удостоверение № 0546/30.01.2009 г.	естер	110 мл/дка	царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата			
			120-150 мл/дка	пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите			
96.	МЕРЛИН 750 ВГ Байер Кропсайанс -Удостоверение № 176/10.01.2005 г.	750 г/кг изоксафлутол	3,5 г/дка	срещу едногодишни широколистни и житни плевели при: картофи	5000	-	2
			5-6 г/дка	лавандула, рози, салвия, резене, лен, нахут			
			6 г/дка	памук			
			12,5 г/дка	царевица - внася се след сеитба (засаждане при картофи), преди поникване на културите или рано на пролет преди вегетацията на лавандула, рози и салвия			
97.	МЕРЛИН ДУО Байер Кропсайанс -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 400/20.02.2007 г.	37,5 г/л изоксафлутол+ 375 г/л тербутилазин	170 мл/дка	Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: царевица - внася се след поникване до 3 лист на клтурата	>1170 >2002	-	2
			200 мл/дка	царевица - внася се след сеитба, преди поникване на културата			
98.	МЕТСУРАМ	200 г/кг		срещу едногодишни широколистни в т.ч.	>5000	30	3

	Ротам Агрокемикъл	метсулфурон-метил	3 г/дка	устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница, ечемик и тритикале - внася се във фаза 2 лист (пшеница) и 3 лист (ечемик) до преди поява на флагов лист.			
99.	МИСТРАЛ 4 СК Синджента -Удостоверение № 364/13.01.2006 г.	40 г/л никосулфурон	120-130 мл/дка	срещу едногодишни житни, балур от коренища и някои широколистни плевели при: царевица - внася се във фаза 2-4 лист на балура и до 8 лист на културата	>5000		3
100.	МОДАОН 4 Ф Фейнхими Швобда -Удостоверение № 176/10.03.2004 г.	480 г/л бифенокс	150 мл/дка	срещу едногодишни широколистни плевели при: слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване или вегетационно във фаза 3-5 лист на културата	>5000		3
101.	МУСТАНГ 306,25 СК Дау Агросайънсис -Удостоверение № 156/05.01.2005 г.	6,25 г/л флорасулам+ 300 г/л 2,4 Д естер		срещу широколистни в т.ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:	1593	65	3
			40 мл/дка или 60 мл/дка	царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата. При наличие на паламида се използва високата доза (60 мл/дка)			
			60-80 мл/дка	пшеница - внася се във фаза братене на културата			
102.	НАПРОГАРД 45 Ф Ариста Лайфсайънс -Краен срок за предлагане на пазара - 07.05.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 07.05.2010 г. -Удостоверение № 336/08.02.2006 г.	450 г/л напропамид	400 мл/дка	срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: тютюн (ориенталски и едрolistен) - внася се преди разсаждането	5000	45	3
103.	НАСА 360 СЛ	360 г/л глифозат		срещу едногодишни и многогодишни	5600	30	3

	Имаспро -Удостоверение № 32/30.06.2003 г.		400-1200 мл/дка	житни и широколистни плевели при: овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища) - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели			
104.	НЕМАСОЛ 510 Таминко . -Удостоверение № 363/08.06.2006 г.	510 г/л метам содиум	80-100 л/дка	галови нематоди, почвени патогени (Фузариум, Вертицилиум, Корки рут, Питиум, Ризоктония Склеротиния) и плевелни семена - за обеззаразяване на почва (в отсъствие на растения) в стоманено-стъклени оранжерии, като по- високата доза се прилага при преобладаващо нападение от почвени патогени. Внася се посредством апликатор с валиране, както и чрез системите за капково напояване, с последващо валиране или покриване с полиетилен	896	-	1
105.	НИРВАНА БАСФ Агро Б.В. -Удостоверение № 0589/27.03.2009 г.	16,7 г/л имазамокс+ 250 г/л пендиметалин	300 мл/дка	срещу едногодишни житни и широ- колистни плевели при: слънчоглед (имитолерантен хибрид "Рими" на ф. "Лимагрейн") - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите	>5000	30	3
			300-400 мл/дка	слънчоглед (имитолерантни хибриди) - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите,			
				като високата доза се използва при прерастнали плевели и силно заплевеля- ване от паламида			
106.	НИТРОГАРД 840 ЕК Мактешим Аган -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата	840 г/л ацетохлор	200-300мл/дка	срещу едногодишни житни в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели при: царевица - внася се след сеитба, преди поникване на културата	2148	-	2
	на наличните количества -						

	31.12.2011 г. -Удостоверение № 410/10.01.2007 г.						
107.	НИТРОГАРД 880 ЕК Мактешим Аган -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 408/10.01.2007 г.	880 г/л ацетохлор+ антидот	200-300мл/дка	срещу едногодишни житни в т.ч.балур от семе и някои широколистни плевели при: царевница - след сеитба, преди поникване на културата	2148	-	2
108.	НОМИНЕ 400 СК+ БИОПАУЪР Кумий кемикъл -Удостоверение № 392/02.02.2007 г.	408 г/л биспирибак- содиум +аджувант	5 мл/дка+ 100 мл/дка	срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: ориз - внасят се във фаза 4-6 лист на културата и 4-5 лист на житните плевели при източена вода	>5000	-	3
109.	ОПТИКА НюФарм	600 г/л мекопроп-П	200 мл/дка	срещу някои слабочувствителни на хормоноподобните хербициди широко- листни плевели при: пшеница - във фаза братене на културата	948	-	2
110.	ОПТИКА КОМБИ НюФарм -Удостоверение № 0547/30.01.2009 г.	300 г/л мекопроп-П+ 300 г/л МЦПА	150-200 мл/дка	срещу широколистни в т. ч. някои слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите	1283	-	2
111.	ОПТИКА ТРИО НюФарм -Удостоверение № 0548/30.01.2009 г.	130 г/л мекопроп-П+ 310 г/л дихлорпроп-П+ 160 г/л МЦПА	150-200 мл/дка	срещу широколистни в т. ч. някои слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите	1083	-	2
112.	ПАНТЕРА 40 ЕК	40 г/л		срещу едногодишни житни плевели и	1140	60	3

	Кемтура -Удостоверение № 64/10.07.2003 г.	квизалофоп-П- тефурил	80 мл/дка	самосевки от житни култури (пшеница и ечемик при: рапица - внася се във фаза 1-3 лист на културата и 3-5 лист на плевелите и самосевките			
			150 мл/дка	срещу едногодишни житни плевели при: слънчоглед, соя, захарно цвекло, домати			
			175 мл/дка	срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от кореница при: слънчоглед, домати, тютюн (ориен- талски и едрolistен)			
			250 мл/дка	соя, захарно цвекло -внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
113.	ПАСИФИК СЛ Агрив АД -Краен срок за предлагане на пазара - 16.09.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 16.09.2010 г. -Удостоверение № 36/05.01.2003 г.	360 г/л 2,4 Д+ 120 г/л дикамба	120 мл/дка	срещу широколистни плевели при: царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата	1276	-	3
114.	ПАСИФИКА ВГ+ БИОПАУЪР Байер Кропсайанс	30 г/кг мезосул- фурон+10 г/кг йодосулфурон+ 90 г/кг антидот (мефемпир- диетил)	35 г/дка+ 70 мл/дка Биопауър	Срещу едногодишни житни и широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница - внася се във фаза 3 лист до средата на братене на житните плевели и от 2-3 до 6 лист на широколистните плевели.	>2000	-	3
115.	ПЕЛИКАН 50 СК Хеминова -Удостоверение № 517/12.07.2007 г.	500 г/л дифлуфеникан	25 мл/дка	срещу едногодишни широколистни плевели при: слънчоглед, фасул - внася се след сеитба, преди поникване на културите	>2000	-	3
116.	ПЕНДИГАН 33 ЕК	330 г/л		срещу едногодишни житни и някои	1050	30	3

	Мактешим Аган	пендиметалин	400 мл/дка	широколистни плевели при: царевица, слънчоглед, тютюн - внася се след сеитба, преди поникване			
117.	ПИК 75 ВГ Синджента -Удостоверение № 554/18.06.2008 г.	750 г/кг просулфурон	1,5 г/дка +0,2 % Атплюс	срещу едногодишни широколистни плевели при: царевица , внася се във фаза 3-8 лист на културата и 2-4 лист на плевелите с 20 л/дка работен разтвор		- 60 за фураж	1
118.	ПИРАМИН ДФ БАСФ -Удостоверение № 524/05.03.2008 г.	650 г/кг хлоридазон	400 г/дка	срещу едногодишни широколистни плевели при: цвекло - внася се преди сеитба с инкорпориране. Забележка: да се прилага само всяка трета година на една и съща площ	3830	-	3
119.	ПЛЕДЖ 50 ВП Сумитомо Кемикъл Агро Юръп -Удостоверение № 543/18.10.2007 г.	500 г/кг флумиоксазин	8 г/дка	срещу широколистни и някои житни плевели при: слънчоглед, царевица - внася се след сеитба, преди поникване на културите, или вегетационно при слънчоглед във фаза 2-4 лист на културата	5000		
120.	ПРОНИТ 720 ЕК Ариста Агросайънсис -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 383/28.11.2006 г.	720 г/л пропизохлор	180-220 мл/дка	срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: захарно цвекло	3425	-	3
			200 мл/дка	тикви			
			200-250 мл/дка	грах, фасул, лук (II, III год)			
			200-300 мл/дка	слънчоглед, соя, картофи, фъстъци, памук			
			250 мл/дка	домати, тютюн			
250-350 мл/дка	царевица - внася се след сеитба (засаждане), преди поникване или преди засаждане на културите						
121.	ПРОПАНИЛ 360 ЕК	360 г/л		срещу едногодишни житни плевели при:	2500	30	3

	Профикол ел Кармен -Краен срок за предлагане на пазара - 30.03.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 30.03.2010 г. -Удостоверение № 42/14.07.2003 г.	пропанил	1500-1800 мл/дка	ориз - внася се във фаза 1-3 лист на плевелите при източена вода			
122.	ПРОПОНИТ 720 ЕК Имаспро -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 126/08.12.2004 г.	720 г/л пропизохлор	200-300 мл/дка	срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата	3425	-	3
123.	ПРОТУГАН 50 СК Мактешим Аган -Удостоверение № 224/09.11.2004 г.	500 г/л изопротурон	350 мл/дка	срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: пшеница и ечемик - внася се след 3 лист на културите, или	1826	45	3
			400-500 мл/дка	пшеница и ечемик - внесен след сеитба, преди поникване на културите			
124.	ПУЛСАР 40 БАСФ Агро Б.В. -Удостоверение № 210/25.01.2005 г	40 г/л имазамокс (ДЕШ ХЦ аджувант)	50 мл/дка+ 100 мл/дка ДЕШ	срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: люцерна стара (с/у овчарска торбичка и други широколистни плевели) в доза 50 мл/дка+ 100 мл/дка ДЕШ, внесен рано на пролет в начало на вегетацията на културата	5000	90	3
			120 мл/дка	слънчоглед (имитолерантен хибрид) - внася се във фаза 2-4 лист на културата;			
				люцерна млада - внася се един месец след			

				засяване			
			120 мл/дка+ 50 мл/дка ДЕШ	слънчоглед - имитолерантен хибрид (вкл. срещу балур от коренища и паламида) - внесени във фаза 2-4 лист на културата			
			120 мл/дка+ 230 мл/дка Стомп нов 330 ЕК	слънчоглед (имитолерантен хибрид - Рими) - срещу едногодишни житни и широколистни плевели и синя китка, внесени при формиране на 2-3 двойка листа на културата			
125.	ПУМА СУПЕР 7,5 ЕВ Байер Кропсайанс -Удостоверение № 173/10.01.2005 г.	69 г/л феноксапроп-П- етил+антидот	100 мл/дка	срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при: пшеница и ечемик - внася се от фаза 3 лист до края на братене на плевелите (дивия овес)	3040	60	1
126.	РАУНДЪП Монсанто -Удостоверение № 240/20.12.2004 г.	360 г/л глифозат+ 180 г/л сърфактант	75 мл/дка	срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: люцерна (срещу кускута) -1-3 дни след прибиране на заразения откос	5600	30	3
			150-200 мл/дка	домати (безразсадни) - преди поникване на културата при поникнали плевели			
			200 мл/дка	памук, тютюн, фъстъци - преди сеитба (разсаждане) на културите при поникнали плевели (5-10 см височина на плевелите). Прилага се с 15-20 л/дка работен разтвор			
			200-300 мл/дка	соя, цвекло и други окопни култури - по метода "намазване" с 50 % разтвор ориз - срещу оризовия трясък - внася се след жътвата			
			400 мл/дка	слънчоглед, соя, пшеница, ечемик - с/у			

				плевели и като десикант - преджътвено при влажност на зърното под 30 %. Прилага се с 15-20 л/дка работен разтвор			
			400-1200 мл/дка	овощни градини, лозя, свободни площи (стърница), канали - във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели			
			500 мл/дка	топола, орех (над 3 години), смърч (над 2 години) - във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели			
			1200 мл/дка	ж.п.линии - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели; пасища (срещу орлова папрат) - внася се при пълно развитие на папратта			
127.	РАФТ 400 СК Байер Кропсайанс -Удостоверение № 7/23.01.2003 г.	400 г/л оксидиаржил	80-100 мл/дка	срещу едногодишни широколистни и житни плевели при: слънчоглед, картофи - внася се след сеитба (засаждане), преди поникване на културите	>5000		3
128.	РЕГЛОН ФОРТЕ Синджента -Удостоверение № 558/25.06.2008 г.	150 г/л дикват + прилепител	300 мл/дка	срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: лозя, овощни градини - внася се в активна вегетация на плевелите	408	30	3
129.	РЕЙСЪР 25 ЕК Мактешим Аган -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.	250 г/л флуорохлоридон	150 мл/дка	срещу едногодишни широколистни плевели при: гладиоли - внася се след засаждане на луковиците	4000	30	3
	-Краен срок за употребата		200 мл/дка	ечемик, копър, резене, царевица -			

	на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 178/10.03.2004 г			внося се след сеитба, преди поникване на културите			
			200-300 мл/дка	картофи - внася се след засаждане, преди поникване на културата. Заб.: възможна е проява на фитотоксичност, която впоследствие се преодолява; слънчоглед в комбинация с Трофи - 150 мл/дка - внася се след сеитба, преди поникване на културата			
			250 мл/дка	пшеница - внася се след сеитба, преди поникване на културата			
			300 мл/дка	слънчоглед, моркови - внася се след сеитба, преди поникване на културите			
			400 мл/дка	лозя, сливи, малини (плододаващи) - рано напролет, преди вегетацията			
			500-600 мл/дка	ябълки - внася се рано напролет, преди вегетацията.			
130.	РИЛЕЙ 90 ЕК Дау Агросайънсис -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 246/05.01.2005 г.	900 г/л ацетохлор	100 мл/дка	срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: слънчоглед - в комбинация с Рейсър 25 ЕК - 150 мл/дка, внесени след сеитба, преди поникване на културата	2148	-	2
			150-180 мл/дка	захарно цвекло			
			150-200 мл/дка	леща, памук			
			150-250 мл/дка	царевица			
			180-220 мл/дка	слънчоглед, картофи, фасул, нахут			
			180-250 мл/дка	фъстъци			
			180-280 мл/дка	соя - внася се след сеитба (засаждане), преди поникване на културите			
131.	РОТЕР Стоктон Кемикъл	600 г/кг метсулфурон		срещу едногодишни широколистни в т. ч. устойчиви на хормоноподобните хербици-	>5000	30	3

	-Удостоверение № 327/09.01.2006 г.		1 г/дка	ди плевели при: пшеница - внася се след 3 лист до края на братене на културите. Заб.: в предложената доза продукта не контролира лепка			
132.	САНАФЕН Дау Агросайънсис -Удостоверение № 215/20.10.2004 г.	600 г/л 2,4 Д ам.сол	120 мл/дка	срещу широколистни плевели при: царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата	375	-	3
			150-200 мл/дка	пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите			
133.	САНГЛИФО Санкио Агро -Удостоверение за продължаване на разрешението № 517/20.10.2007 г.	360 г/л глифозат	400-1200 мл/дка	срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: овощни градини, лозя, свободни площи (стърница)	5600	30	3
			1200 мл/дка	ж.п.линии -внася се в фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели			
134.	САТУРН 500 ЕК Кумий -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 179/10.03.2004 г.	500 г/л тиобенкарб	1000 мл/дка	срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: ориз, памук - внася се след сеитба, преди поникване на културите	1700		3
135.	САФАРИ 50 ДФ ДюПонт ИО -Краен срок за предлагане на пазара - 30.06.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 30.06.2010 г. -Удостоверение № 60/21.07.2003 г.	500 г/кг трифлуосулфурон-метил	3+3 г	срещу едногодишни широколистни плевели при: захарно цвекло - внася се двукратно в комбинация с Бетанекс - 200 мл/дка и прилепител Тренд - 0,1 %: I-во трет. след 1-ви чифт същински листа на културата и от котиледони до 2-ри лист на плевелите; II-ро след 7-10 дни	5000		3
136.	СЕКАТОР ВГ	12,5 г/кг		срещу широколистни в т. ч. слабо-	>5000	-	3

	Байер Кропсайанс 174/10.01.2005 г.	йодосулфурон+ 50 г/кг амидосулфурон+ антидот	20-30 г/дка	чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница и ечемик - внася се след 3 лист до края на братене на културите, високата доза се прилага при прораснали плевели и преобладаващо заплевеляване от паламида			
137.	СЕКАТОР ОД Байер Кропсайанс -Удостоверение № 371/14.08.2006 г.	106 г/л амидо- сулфурон+ 25 г/л йодосулфурон	10 мл/дка	срещу едногодишни широколистни в т. ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели и паламида при: пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите	>5000	-	3
138.	СЕЛЕКТ 240 ЕК Ариста Лайфсайънс -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 352/01.12.2005 г.	240 г/л клетодим	40 мл/дка	срещу едногодишни житни плевели при: домати, зах. цвекло, слънчоглед, соя, картофи, фасул - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите с прилепител Амиго - 80 мл/дка	1630		3
			80 мл/дка	срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: домати, зах. цвекло, слънчоглед, соя, картофи, фасул - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура) с прилепител Амиго - 160 мл/дка			
139.	СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК Ариста Лайфсайънс -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата	120 г/л клетодим+ прилепител	80 мл/дка	срещу едногодишни житни плевели при: слънчоглед, зах. цвекло, фасул, картофи	1360	-	3
			160 мл/дка	срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: слънчоглед, захарно цвекло, фасул,			

	на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение за № 348/01.12.2005 г.			картофи - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
140.	СКОРПИО СУПЕР 7,5 ЕВ Имаспро ИМАСПРО 7,5 ЕВ Валидност на разрешението: 28.12.2012 г. -Удостоверение № 0600/28.05.2009 г.	69 г/л феноксапроп-П-етил+антидот	100 мл/дка	срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при: пшеница и ечемик - внася се от фаза 3 лист до края на братене на дивия овес	>5000	60	3
141.	СКОРПИО СУПЕР 100 ЕК Имаспро ИМАСПРО 100 ЕК -Удостоверение № 372/28.05.2006 г. -Краен срок за предлагане на пазара - 16.09.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 16.09.2010 г.	100 г/л феноксапроп-П-етил+антидот	70 мл/дка	срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при: пшеница и ечемик - внася се от фаза 3 лист до края на братене на дивия овес	>5000	60	2
142.	СПРИНТ 20 ВП Форвард -Удостоверение № 43/14.07.2003 г.	200 г/кг хлорсулфурон	4-4,5 г/дка	срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница и ечемик - след фаза 3 лист на културите и ранни фази на плевелите	5545	60	3
143.	СПРИНТ 75 ВП Форвард	750 г/кг хлорсулфурон		срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:	5545	60	3
	-Удостоверение № 44/14.07.2003 г.		1-1,5 г/дка	пшеница и ечемик - внася се внася се			

				след 3 лист на културите и ранни фази на плевелите			
			2-2,5 г/дка	пшеница - внася се след сеитба, преди поникване			
144.	СТОМП® АКВА БАСФ Агро Б.В. -Удостоверение № 010011-ПРЗ/ 12.10.2009 г.	455 г/л пендиметалин БАСФ Агро БВ - Швейцария	350-400 мл/дка	срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: царевица, слънчоглед, памук, лук (от арпаджик), нахут, тютюн, кориандър, картофи - внася се след сеитба /засаждане/, преди поникване и преди засаждане на тютюна, или	1250	60 царевица лук слънчоглед 75 кориандър 40 нахут неприложим памук тютюн картофи	3
			350 мл/дка	царевица, слънчоглед, лук (от арпаджик) - в началото на вегетацията на културите и до 2-ри лист на плевелите.			
145.	СТОМП НОВ 330 ЕК БАСФ Агро Б.В. -Удостоверение № 376/08.02.2006 г.	330 г/л пендиметалин	230 мл/дка+ 40-120 мл/дка Пулсар 40	срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: слънчоглед (клиърфилд толерантни хибриди) - срещу едногодишни житни и широколистни плевели и синя китка, внесени при формиране на 2-3 двойка листа на културата	1250	40 нахут фасул соя фъстъци 60 лук ягоди малини царевица	3
			300-400 мл/дка 400 мл/дка	гладиоли (луковици) - внася се след засаждане, преди поникване на културата царевица, слънчоглед, памук, фасул, соя, фъстъци, кориандър - внася се след сеитба, преди поникване на културите; тютюн - внася се преди засаждане;			
				мента - преди или след засаждане;		слън-	

				ягоди - внася се рано напролет, след първата обработка на почвата		чоглед	
			400-500 мл/дка	картофи, лук I, II год. - след сеитба (за-саждане), преди поникване на културите домати, пипер (разсадни) - внася се преди разсаждане на културите		75	
			450 мл/дка	ечемик - внася се след сеитба, преди поникване на културата нахут - внася се след сеитба, преди поникване на културата		дома-ти и пипер	
				царевича, слънчоглед - в начало на вегета-ция на културата и до 2 лист плевелите		разс. мента	
			500 мл/дка	пшеница - внася се след сеитба, преди поникване на културата		кори-андър	
			600 мл/дка	малини, овощни градини - рано на про-лет, след първата обработка на почвата		90	
				ориз - внася се след сеитба, преди поникване на културата или след поникване на културата във фаза 2-3 лист		пше-ница	
						ечемик	
						ориз	
						непри-ложим	
						карто-фи	
						памук	
						тютюн	
						глади-оли	
146.	СТРЕЧ 60 ВП Форвард Краен срок за предлагане на пазара - 16.12.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 16.12.2010 г. -Удостоверение № 182/10.03.2004 г.	600 г/кг метсулфурон		срещу едногодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоно-подобните хербициди плевели при:	5000	-	3
			1-1,5 г/дка	пшеница и ечемик - внася се от 3 лист до края на братене на културите			
			1,5-2 г/дка	пшеница и ечемик - внася се след сеитба, преди поникване на културите			
147.	СУЛТАН 500 СК	500 г/л		срещу едногодишни широколистни	2150	70	3

	Мактешим Аган -Удостоверение № 98/21.10.2004 г.	метазахлор	200 мл/дка	плевели при: маслодайна рапица - внася се след сеитба, преди поникване на културата			
148.	ТАЙГЪР ПЛАТИНИУМ 5 ЕК Имаспро -Удостоверение № 191/17.01.2005 г.	50 г/л квизалофоп-П-етил	200 мл/дка	срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: слънчоглед - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)	>2000	60	3
149.	ТАЙГЪР ПЛАТИНИУМ® 5 ЕК Агрива АД -Удостоверение № 33/05.01.2003 г.	50 г/л квизалофоп-П-етил	200 мл/дка	срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: слънчоглед - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)	>2000	60	3
150.	ТАРГА СУПЕР 5 ЕК Нисан кемикъл -Удостоверение № 114/01.12.2004 г.	50 г/л квизалофоп-П-етил	120 мл/дка	маслодайна рапица - срещу кокоше просо, видове кощрява, кръвно просо, ветрушка, лисича опашка, див овес и самосевки от житни култури - внася се във фаза 2-3 лист на самосевките плевелите	2550	60	рапица 90
			150 мл/дка	срещу едногодишни житни плевели при: слънчоглед, соя, захарно цвекло, памук, лук, тютюн, фасул, картофи, домати, ягоди, малини			
			175 мл/дка	срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: домати			
			200 мл/дка	слънчоглед			
			200-250 мл/дка	соя, зах. цвекло, памук, тютюн, фасул			
250-300 мл/дка	картофи, домати, лук, ягоди						
			300 мл/дка	малини			

			300-600 мл/дка	лозя - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
151.	ТАУРУС Стоктон Кемикъл -Удостоверение № 328/09.01.2005 г.	50 г/л квизалофоп-П- етил	200 мл/дка	срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: слънчоглед - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура).	2550	60	3
152.	ТЕРИДОКС 500 ЕК Синджента	500 г/л диметахлор	250-300 мл/дка с 40 л/дка раб.р-р	срещу кокоше просо, кръвно просо, сива кощрява, зелена кощрява, прешленеста кощрява, балур от семе, видове щир, татул, видове лайка, врабчови чревца, бръшлянолистно великденче, бяла куча лобода, дребноцветна галингоза, овчарска торбичка, тученица, черно куче грозде, едногодишна метлица, самосевки от пшеница, полско подрумче, полски синап, войничница, лечебен росопас при: зимна маслодайна рапица - внася се след сеитба, преди поникване и ранни фази на плевелите	1600- 2000	-	2
153.	ТЕРМИДОР 4 СК Шарда Уърлдуайтс Пвт. Лтд - Индия -Удостоверение за № 0598/14.05.2009 г.	40 г/л никосулфурон Шандонг Гудфармър Кемикълс Ко. Лтд. - Китай	125 мл/дка	срещу балур от семе и коренища, зелена и сива кощрява, кокошо просо, кръвно просо, пирей, райграс, лисича опашка, див овес, кисели треви при: царевича - внася се във фаза 2-4 лист на балура и до 8 лист на културата.	5000	-	3
164.	ТИТУС 25 ДФ ДюПонт Ю	250 г/кг римсулфурон	4-6 г/дка	срещу едногодишни житни плевели и балур от коренища при: царевича, картофи	5000	30	3
			5 г/дка	домати - внася се във фаза 2-4 лист на плевелите (20-25 см височина на балура) и до 8 лист на царевичата. При царевича може да се комбинира с 2,4 Д. Прилага се с			
				прилепител Тренд - 0,1 %, а при царевича и			

				с прилепител Елект 90 ЕК - 0,15 %. Да не се използва при картофи сорт Бинте			
155.	ТИТУС ПЛЮС ВГ ДюПонт ИО -Удостоверение № 0543/20.10.2008 г.	3,26 % римсулфурон + 60,87 % дикамба	30,7 г/дка	срещу едногодишни и многогодишни житни и едногодишни широколистни плевели при: царевича - внася се във фаза 2-6 лист на културата. Забележка: прилага се с прилепител Тренд - 0,1 %	>2000	30	3
156.	ТОЛУРЕКС 500 СК Мактешим Аган -Удостоверение № 503/18.06.2007 г.	500 г/л хлортолурон	350-400 мл/дка	срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: пшеница и ечемик - внася се след сеитба, преди поникване, или след 3 лист на културите и ранни фази на плевелите	10000	30	3
157.	ТОМИГАН 250 ЕК Мактешим Аган -Краен срок за предлагане на пазара - 16.09.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 16.09.2010 г. -Удостоверение № 355/06.01.2006 г.	250 г/л флуороксипир	80 мл/дка	срещу лепка, звезда, фасулче, глушина, незабравка, попова лъжичка, повитица при: пшеница и ечемик - внася се след 3 лист до братене на културите. Заб.: повитицата е чувствителна само в начало на цъфтеж.	5000		3
158.	ТОПИК 080 ЕК Синджента -Удостоверение № 23/10.04.2003 г.	80 г/л клодинафоп +антидот	30-50 мл/дка	срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при: пшеница - внася се от фаза 3 лист до края на братене на дивия овес	1829		3
159.	ТОРНАДО 5 ЕК Агролекс -Удостоверение № 198/19.01.2005 г.	50 г/л квизалофоп-П-етил	200 мл/дка	срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: домати - внася се фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)	2350	60	3
160.	ТОРНАДО® 5 ЕК	50 г/л		срещу многогодишни житни плевели в	2350	60	3

	Агрива АД -Удостоверение № 38/05.01.2003 г.	квизалофоп-П- етил	200 мл/дка	т.ч. балур от коренища при: слънчоглед - внася се фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
161.	ТРЕВИСИМО СК Ариста Лайфсайнс	250 г/л диурон+ 250 г/л глифозат	500+500 мл/дка с 30 л/дка раб.р-р	срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: лозя - внася се двукратно, като: 1-во третиране преди отваряне на пъпките на лозата, а на площи заплевелени с балур при 20-25 см височина на балура; 2-ро 60 дни след първото с насочено пръскане	2000	-	2
162.	ТРОФИ Дау Агросайънсис -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 248/05.01.2005 г.	768 г/л ацетохлор+ антидот	220-260 мл/дка	срещу едногодишни житни в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели при: слънчоглед	2148		2
			220-320 мл/дка	царевича, соя			
			250-300 мл/дка	фъстъци - внася се след сеитба, преди поникване на културите			
162.	ТРОФИ 40 КС Дау Агросайънсис -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.	400 г/л ацетохлор	400-500 мл/дка	срещу едногодишни житни в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели (щир, лобода) при: царевича - внася се след сеитба, преди поникване на културите	2148		2
164.	ТРОФИ СУПЕР 840 ЕК Дау Агросайънсис -Краен срок за предлагане	840 г/л ацетохлор+ 28 г/л антидот (фуриразол)	200-250 мл/дка	срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата	2148	-	2
	на пазара - 31.12.2010 г.		200-300 мл/дка	царевича - след сеитба, преди поникване			

	-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 365/29.06.2006 г.		300 мл/дка	памук - след сеитба, преди поникване			
165.	ТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ Синджента -Удостоверение № 010015-ПРЗ/ 14.10.2009 г.	360 г/л глифозат	150 мл/дка	срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: стърница	>5000	30	3
			200 мл/дка	лозя и овощни градини			
			300 мл/дка	срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: пшеница и ечемик , внесен преджътвено, при влажност на зърното под 30 %.			
			400 мл/дка	срещу многогодишни житни и широколистни плевели при: стърница			
			600 мл/дка	лозя и овощни градини - внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели			
166.	У 46 М ФЛУИД Ню фарм	500 г/л МЦПА	200 мл/дка	срещу широколистни плевели при: пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите	700	-	2
167.	УИДМАСТЕР 464 СЛ Синджента -Удостоверение № 528/17.06.2008 г.	344 г/л 2,4 Д+ 120 г/л дикамба	80-100 мл/дка	срещу широколистни в т. ч. слаб-очувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите	1347	-	3
			120 мл/дка	царевица - във фаза 3-5 лист на културата			
168.	УИНГ-П	212,5 г/л		Срещу едногодишни житни и широко-	1480	30	3

	БАСФ -Удостоверение № 530/12.07.2007 г.	диметенамид-П+ 250 г/л пендиметалин	300-400 мл/дка	листни плевели при: царевица и слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културите			
169.	ФЕН 24 ЕК Имаспро -Удостоверение № 367/05.07.2006 г. СМЕРЧ 24 ЕК Удостоверение № 374/28.08.2006 г. -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.	240 г/л оксифлуорфен	80 мл/дка	срещу едногодишни и някои много- годишни широколистни плевели при: слънчоглед - внася се вегетационно за културата и фаза 2-4 лист на плевелите	5000	45	3
			80-100 мл/дка	слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата Забележка: Възможна е проява на фитотоксичност, която се преодолява в последствие			
			150 мл/дка	лозя - внася се вегетационно (април- май) с насочено пръскане			
170.	ФЕН® 24 ЕК Агрив АД -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 32/05.11.2003 г.	240 г/л оксифлуорфен	80-100 мл/дка	срещу едногодишни и някои много- годишни широколистни плевели при: слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата. Забележка: Възможна е проява на фитотоксичност, която се преодолява.	5000	45	3
171.	ФОКСТРОТ 69 ЕВ Хеминова -Удостоверение № 518/12.07.2007 г.	69 г/л феноксапроп-П- етил+ антидот	100 мл/дка	срещу едногодишни житни в т. ч. див овес при: пшеница и ечемик - внася се от фаза 3 лист до края на братене на плевелите (дивия овес)	>5000	60	1
172.	ФОКУС УЛТРА	100 г/л		срещу едногодишни житни плевели при:	3940	60	3

	СТРАТОС УЛТРА БАСФ -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение за разрешаване № 580/07.01.2009 г.	циклоксидим+тензит	100 мл/дка	слънчоглед, захарно цвекло, соя, фасул, грах, люцерна; маслодайна рапица - срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури - внася се във фаза 2-5 лист на плевелите и самосевките			
			200 мл/дка	срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: слънчоглед, захарно цвекло, соя, фасул, грах, люцерна - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
			200 мл/дка с 30-40 л/дка работен разтвор	срещу едногодишни и многогодишни житни плевели при: циклоксидим толерантна царевица (СТМ) - внася се вегетационно за културата и 3-5 лист на плевелите. Заб.: троскот - умерено чувствителен			
173.	ФРОНТИЕР СУПЕР БАСФ -Удостоверение № 184/10.03.2004 г. СПЕКТРУМ -Удостоверение № 360/26.04.2006 г.	720 г/л диметенамид-П	80-140 мл/дка	срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: царевица, слънчоглед, захарно цвекло, соя, картофи - внася се след сеитба, преди поникване на културите	1480	-	3
174.	ФУЗИЛАД ФОРТЕ Синджента -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.	150 г/л флуазифоп-П- бутил+ прилепител	50 мл/дка	срещу едногодишни житни плевели при: маслодайна рапица - срещу самосевки от житни култури, внесен във фаза 3-5 лист на самосевките	3680	60	3
	-Краен срок за употребата		80 мл/дка	слънчоглед			
			90 мл/дка	памук, тютюн, соя, фасул, фъстъци,			

	на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 264/05.04.2005 г.			домати, пипер, картофи срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: слънчоглед, памук, тютюн, домати, фасул 100-130 мл/дка 130 мл/дка соя, фъстъци, пипер, картофи - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
175.	ФУРОРЕ СУПЕР 7,5 ЕВ Байер Кропсайанс -Удостоверение за № 185/10.03.2004 г.	69 г/л феноксапроп-П- етил	120 мл/дка 200 мл/дка	срещу едногодишни житни плевели при: слънчоглед, захарно цвекло, фасул, лук, картофи, грах, соя, домати, пипер, чесън срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: слънчоглед, захарно цвекло, лук, фасул, домати, грах, картофи, соя, пипер, чесън - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)	2357	30	2
176.	ХАРМОНИ ЕКСТРА ДюПонт ИО -Удостоверение № 538/20.10.2008 г.	500 г/кг тифенсулфурон+ 250 г/кг трибенурон	1,5 г/дка	срещу едногодишни широколистни в т. ч. слабочувствителни на хормоноподоб- ните хербициди плевели при: пшеница и ечемик - след 3-ти лист на културите и ранни фази на плевелите се прилага с прилепител Тренд - 0,15 %	5000	30	3
177.	ХАРНЕС Монсанто -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества -	900 г/л ацетохлор	150-200 мл/дка 150-250 мл/дка	срещу едногодишни житни в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели при: слънчоглед царевица, соя, памук, тютюн - внася се след сеитба, преди поникване на културите	2148	-	2
	31.12.2011 г.						

	-Удостоверение за № 417/30.01.2007 г.						
178.	ХЕРБАФЛЕКС Щелер -Удостоверение № 291/06.10.2005 г.	85 г/л бефлубутамид+500 г/л изопротурон		срещу едногодишни житни и широколистни в т. ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:	>2000	90	2
			200 мл/дка	пшеница - внася се от 3 лист до края на братене на културата			
179.	ХЕРБОКСОН 600 НюФарм -Удостоверение № 0550/30.01.2009 г.	600 г/л 2,4 Д ам.сол		срещу широколистни плевели при:	500	-	3
			120 мл/дка	царевича - внася се във фаза 3-5 лист на културата			
			150-200 мл/дка	пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите			
180.	ХЛОРТОСИНТ 700 СК Ню Фарм -Удостоверение № 267/13.01.2005 г.	700 г/л хлортолурун	230-350 мл/дка	срещу едногодишни житни плевели при: пшеница и ечемик - след сеитба, преди поникване, или след 3-ти лист на културите и ранни фази на плевелите	10000	30	3
181.	ХУСАР МАКС ВГ+ БИОПАУЪР Байер Кропсайанс -Удостоверение № 322/06.01.2006 г.	30 г/кг мезосулфурон+ 30 г/кг йодосулфурон+ антидот (мефенпир-диетил)+ прилепител	20 г/дка+ 40 мл/дка; 25 г/дка+ 50 мл/дка	срещу едногодишни житни и широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница - внася се от фаза 3-ти лист до края на братене на културата. Заб.: ниската доза се препоръчва срещу широколистни, а високата срещу житни плевели (див овес, лисича опашка)	5000	-	3
182.	ХУСАР МАКС ОД Байер Кропсайанс -Удостоверение № 523/12.07.2007 г.	8 г/л мезосулфурон+ 8 г/л йодосулфурон+ 23 г/л антидот	100 мл/дка	срещу едногодишни житни и широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели и див овес при: пшеница - внася се от 3 лист до братене на културата	5000	-	3