

И Н С Е К Т И Ц И Д И

№	Продукт, Производител	Активно вещество	Доза/дка (концентра- ция)	Култура, вредител, при които се прилага продуктът	ЛД ₅₀ мг/кг орално за плъх	Каран- тинен срок в дни	Кatego- рия за упот- реба
1.	АВАНТ 15 СК ДюПонт ИО -Удостоверение № 564/14.10.2008 г.	150 г/л индоксикарб	0,025 %	шарен гроздов молец (приложен в начало на яйцеснасянето);	1700	1 зеле 7 овощни 10 грозде	2
			0,035 %	ябълков плодов червей (приложен в начало на яйцеснасянето)			
			20 мл/дка	зелева нощенка по зеле			
2.	АДМИРАЛ 10 ЕК Сумитомо кемикъл -Удостоверение № 27/09.06.2003 г.	100 г/л пирипроксифен	0,05 %	оранжерийна белокрылка (домати и краставици)	5000	3	2
3.	АЕРОЗОЛЕН ПРЕПАРАТ XXL Деция Дегеш	4 г/л естествени пиретрини+ 16 г/л пиперонил бутоксид	100 мл/100м ³	третиране на складове за тютюн срещу възрастни индивиди на тютюнев молец и тютюнев бръмбар. Третирането се извър- шва с електрически генератор за студен аерозол - М 1026 или с гръбно-моторна пръскачка с приспособление за УЛВ третиране; големина на капките - 30 μ.	>5000	-	2
4.	АКТАРА 25 ВГ Синджента -Удостоверение № 95/17.09.2004 г.	250 г/кг тиаметоксам	0,007 %	памукова листна въшка по краставици; листни въшки по пипер	>5000	3 зелен- чуци 7 картофи 14 тютюн житни	3
			0,03 %	оранжерийна белокрылка по зеленчуци (домати и краставици)			
			6 г/дка	колорадски бръмбар, листни въшки по картофи (зеленовичеста, картофена, зелена прасковена и черна бобова листни въшки)			

			7 г/дка	вредна житна дървеница, обикновен житен бегач		слън-чоглед царе-вица не се изисква	
			8 г/дка	листни въшки по житни култури			
			10 г/дка	житни мухи (хесенска и шведска)			
			13 г/дка	сив царевичен хоботник по слънчоглед; сив царевичен хоботник по царевица			
			20 г/дка	тютюнева листна въшка по тютюн; зелена ябълкова листна въшка - 100 л/дка работен разтвор			
				-за приложение чрез система за капково напояване срещу комплекс от неприятели: оранжерийна белокрылка и листни въшки: памукова листна въшка; зелена праско- вена листна въшка по зеленчуци (домати и краставици) в оранжерии:			
			40+40 г/дка	двукратно - при млади растения на възраст до 6 седмици - 1-во внасяне - 10-14 дни след разсаждане (40 мл/дка); 2-ро внасяне - 14 дни след първото (40 мл/дка), или			
			80 г/дка	еднократно - при растения на възраст повече от 6 седмици			
5.	АКТЕЛИК 50 ЕК Синджента -Удостоверение № 01004-ПРЗ/ 01.10.2009 г.	500 г/л пиримифос- метил	0,2 % с 0,5 л/м ² при експоз. 48 h	за влажна дезинсекция на празни складови помещения срещу: складови неприятели (с тракторна пръскачка)	2050	7	3
			1,5 см ³ с 12 мл вода за 10 м ³ празно пространство	складови неприятели в силосни клетки (третира се с атомизиращ електрически разпръсквач М 1026). Експозиция 48 ч			
			1 см ³ на 1 м ² площ и разх. на р-р 0,5-1л/ м ²	складови неприятели в празни складове (третира се с тракторна пръскачка). Експозиция 48 ч			

6.	АЛВЕРДЕ БАСФ СЕ	240 г/л метафлумизон	20 мл/дка	колорадски бръмбар - при картофи полско производство до фаза образуване на клубени /клубените достигат 60-70 % от крайното си тегло/ Забележка: максимален брой приложения две, с интервал на третиране - 7-10 дни	>5000	14	3
7.	АЛСИСТИН 25 ВП Байер Кропсайанс -Крайен срок за предлагане на пазара-16.09.2009 г. -Крайен срок за употребата на наличните количества - 16.09.2010 г. -Удостоверение № 141/04.02.2004 г.	250 г/л трифлумурон	0,04 %	ябълков плодов червей	5000	30	3
			0,05 %	кръгломиниращ молец			
			0,1 %	листоминиращи мухи по домати в оранжерии			
8.	АЛУФОС овални таблетки Имаспро -Удостоверение № 315/16.05.2005 г.	56-57 % алуминиев фосфид	10 табл./тон зърно	за обеззаразяване на зърно с/у: житна гъгрица, оризова гъгрица, зърнов бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар, Palorus sp. - Експозиция 3 денон. при t на зърното 20°C; 5 денон.при t 15-20°C; 7 денон.при t 10-15°C. Заб.: третирането да се извършва чрез сонда, автоматичен дозатор над лента или редлер, или ръчно пускане. Купът със зърното да се покрие с полиетилен или гумиран брезент, след зареждане с продукта	11,8	45	1
9.	АЛФАГАРД 10 ЕК Гарда кемикъл -Удостоверение № 50/14.07.2003 г.	100 г/л алфа- циперметрин	0,0125 %	шарен гроздов молец	170	7	2
			0,015 %	анарзия по кайсия			
			12,5 мл/дка	вредна житна дървеница (ларви); обикновена житна пиявица			

10.	АПЛАУД 25 ВП Нихон Нояку -Краен срок за предлагане на пазара - 30.03.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 30.03.2010 г. -Удостоверение № 143/05.02.2004 г.	250 г/кг бупрофезин	0,1 % и 0,05 %	оранжерийна белокрилка по зеленчуци в оранжерии - по схема: при буен растеж на растенията и ниска плътност на неприятеля, три третираня - I и II - концентр. 0,05 % през 14 дни, след 20 дни III с 0,1 %	2190	7	3
			100 г/дка	оранжерийна белокрилка по тютюн			
11.	БАНДИТ 10 ЕВ Транскем профешенъл	100 г/л циперметрин		за обеззаразяване на празни складове чрез влажна дезинсекция с/у: житна гърица, оризова гърица, зърнов бръмбар, ръждиво-червен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар. Експозиция 48 h.	2500	-	2
			0,8 мл+12 мл вода за 10 м ³	-при третиране с ел. аерозолен генератор за студен аерозол М 1026			
			0,1% и 0,5 л/м ² раб. р-р	-при третиране с тракторна пръскачка с монтиран шланг и шека за пръскане			
12.	БИ-58 БАСФ -Удостоверение № . 79/23.07.2003 г.	400/л диметоат	0,05 - 0,07 %	зелена прасковена листна въшка; виолетова стридоподобна щитоносна листна въшка по овощни култури	790	21	3
			0,08 %	хмелова листна въшка			
			0,1 %	оранжерийна белокрилка; обикновена сливова щитоносна въшка			
			0,15 %	кръгломиниращ молец			
			0,2 %	калифорнийска щитоносна въшка (млади ларви); черничева щитоносна въшка (млади ларви); дървесница; дървесинойд - напръскване на кората			

			50 мл/дка	малка сливова листна въшка			
			150 мл/дка	листни бълхи по захарно цвекло			
			200 мл/дка	голям люцернов хоботник по хмел; зелена прасковена листна въшка по тютюн; тютюнев трипс по тютюн			
13.	БИСКАЯ 240 ОД Байер КропСайанс -Удостоверение № 521/12.07.2007 г.	240 г/л тиаклоприд	0,06 % (60 мл/дка)	зелена прасковена листна въшка по зеленчуци; памукова листна въшка по зеленчуци	>500 <1000	3 зеле- нчуци 21 картофи 30 пше- ни ца	2
			20 мл/дка	колорадски бръмбар; обикновен житен бегач			
			25 мл/дка	рапичен цветояд			
14.	БОНУС СК БАСФ Агро Б.В. -Удостоверение № 80/23.07.2003 г.	40 г/л алфа- циперметрин+ 120 г/л тефлубензурон	25 мл/дка	колорадски бръмбар по картофи; вредна житна дървеница; обикновена житна пиявица	5000	28	3
15.	ВАЗТАК НОВ 100 ЕК БАСФ Агро Б.В. -Удостоверение № 533/30.08.2007 г.	100 г/л алфа- циперметрин	0,0125 %	ябълков плодов червей; източен плодов червей; сливов плодов червей; гроздови молци	200	7 овощни фасул домати крас- тавици картофи 14 люцерна грозде пипер грах ливади 24 цвекло 30	3
			0,015 %	кръгломиниращ молец; черешова муха; малка и голяма зимна педомерка, розена, глогова и кафявопетниста листозавивачки, пръстенотворка; анарзия по кайсия			
			0,02 %	крушова листна бълха; обикновена сливова щитоносна въшка			
			0,025 %	гамозначна нощенка по хризантема и гербер			
			0,03 %	миниращи мухи по зеленчуци (домати, фасул) - с/у имагото; оранжерийна бело- крилка по зеленчукови култури в оран- жерии; листни въшки по хризантема			
			10 мл/дка	колорадски бръмбар			

			12 мл/дка	вредна житна дървеница - самолетно пръскане с дюзи тип дъждовна капка с разход на разтвор 1,5 л/дка		рапица житни 60 тютюн	
			12,5 мл/дка	цвеклови щитовки; цвеклови бълхи; вредна житна дървеница (ларви); обикновена житна пиявица; зелева нощенка по захарно цвекло			
			15 мл/дка	ливадна пеперуда (гъсеници II-III възраст)			
			16 мл/дка	тютюнев трипс по тютюн - самолетно - с дюзи тип дъждовна капка с 1,5 л/дка р-р			
			20 мл/дка	агрилус по маслодайна роза; вредна житна дървеница (възраст); маков листояд; грахова листна въшка по грах; рапичен цветояд; мъхнат бръмбар по рапица; ливадна пеперуда (гъсеници IV и V възраст); италиански и марокански скакалци			
			30 мл/дка	листни въшки по пипер; оранжерийна белокрилка и листни въшки по тютюн; трипс по тютюн; житен бегач (ларви)			
16.	ВАЛСАФИД Стоктон Кемикъл -Валидност на разрешението: 31.12.2011 г. -Удостоверение № 165/06.01.2005 г.	560 г/кг алуминиев фосфид	2 табл./м ³	за обеззаразяване на празни складове и производствени помещения срещу: житна гърица, оризова гърица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар, сив брашнен молец, тютюнев молец. Експозиция - 3 денонощия при t над 20° C и 5 денонощия при t под 20° C. Забележка: Продуктът да се разпределя равномерно и да се изключва електрозахранването	11,5	45	1

			8 табл./тон зърно	с/у: житна гъгрица, оризова гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар при съхранение на зърно в силосни клетки с автоматичен дозатор Дегеш - при експозиция 3 денонощия при t над 20° С и 5 денонощия при t под 20° С.			
			10 табл./тон зърно	с/у: житна гъгрица, оризова гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар при съхранение на зърно в насипно състояние в складови помещения . Експозиция 3 денон. при t над 20° С и 5 денон. при t под 20° С. Забележка: Третирането да се извърши със сонда с автоматичен брояч. Повърх-ността на зърновия слой се покрива с полиетилен.			
17.	ВИДЕЙТ 10 Г ДюПонт ИО -Удостоверение № 0572/14.10.2008 г.	100 г/кг оксамил	2 кг/ска	телени червеи по картофи - браздово, едновременно със засаждане на картофите	5,4 а.в.	21	1
18.	ВИДЕЙТ 10 Л ДюПонт ИО -Удостоверение № 0573/14.10.2008 г.	100 г/л оксамил	1 л/дка	комплекс от неприятели по зеленчуци (домати, краставици): оранжерийна бело-крилка и галови нематоди в доза 1 л/дка, приложен със система за капково напояване - 2-3 третириания през 15-20 дни, като първото е 2 седмици след разсаждане	5,4 а.в.	3	1
19.	ГАУЧО ФС 600 Байер Кропсайанс -Удостоверение № 243/01.03.2005 г.	600 г/л имидаклоприд	100 мл/ единица цвеклови семена	цвеклови хоботници: обикновен цвеклов хоботник, сив царевичен хоботник, черен цвеклов хоботник; цвеклови бълхи; зелена прасковена листна въшка по зах. цвекло	>200 <2000	-	2

			700 мл/100 кг семе	телени червеи по царевица			
			800 мл/100 кг семе	сив царевичен хоботник по царевица			
			1 л/100 кг семе	сив царевичен хоботник по слънчоглед; телени червеи по слънчоглед			
20.	ДАНАДИМ ПРОГРЕС 400 ЕК Хеминова -Удостоверение № 324/09.01.2006 г.	400 г/л диметоат	0,05 %	памукова листна въшка по зеленчуци (краставици)	790	21	3
			0,075 %	зелена прасковена листна въшка по зеленчуци (пипер и краставици)			
			200 мл/дка	тютюнев трипс по тютюн (ларви и имаго)			
21.	ДЕЛИЦИЯ ГАЗТОКСИН таблетки Делиция Фрайберг -Удостоверение № 1/03.02.2003 г	56,8 % алуминиев фосфид	8 табл./тон зърно	за обеззаразяване на зърно в силозни клетки с/у: оризова гърица, житна гърица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар - при експозиция: 3 денон. при t на зърното над 20°C; 5 денон. при t на зърното 15-20°C; 8 денон. при t на зърното 10-15°C	11,8	45 за зърно	1
			10 табл./тон зърно	за обеззаразяване на зърно в насипно състояние в складове с/у: оризова гърица, житна гърица, ръждивочервен брашнен бръмбар, зърнов бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар. Експозиция: 3 денон.при t на зърн. над 20° С; 5 денон. при t на зърн. 15-20°C 8 денон.при t на зърн.10-15°C			
			2 табл./м ³	за обеззаразяване на празни складове и работни помещения срещу: оризова гърица, житна гърица, зърнов бръм-			

				бар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар, молец по сушените плодове, сив брашнен молец, тютюнев молец - при експозиция: 3 денон. при t на въздуха над 20°C; 5 денон. при t на въздуха 15-20°C; 8 денон. при t на въздуха 10-15°C			
22.	ДЕЛИЦИЯ ГАЗТОКСИН пелети Делиция Фрайберг -Удостоверение № 24/03.02.2003 г.	56,8 % алуминиев фосфид	40 пелети/ тон зърно	за обеззаразяване на зърно в силосни клетки с/у: оризова гърица, житна гърица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар. Експозиция: 3 денон. при t на зърното над 20°C; 5 денон. при t на зърното 15-20°C; 7 денон. при 10-15°C	11,8	45 за зърно	1
			50 пелети/ тон зърно	за обеззаразяване на зърно в насипно състояние в складове с/у: оризова гърица,			
				житна гърица, суринамски брашнояд, ръждивочервен брашнен бръмбар, ръждивочервен зърнов бръмбар, зърнов бръмбар. Експозиция: 3 денон. при t на зърното над 20°C; 5 денон. при t на зърното 15-20°C; 7 денон. при 10-15°C			
			10 пелети/м ³	за обеззаразяване на празни складове и работни помещения с/у: оризова гърица, житна гърица, суринамски брашнояд, ръждивочервен брашнен бръмбар, ръждивочервен зърнов бръмбар, зърнов бръмбар. Експозиция: 3 денон. при t на въздуха над 20°C; 5 денон. при t на въздуха 15-20°C; 7 денон. при 10-15°C			

23.	ДЕЦИС 2,5 ЕК Байер Кропсайанс -Удостоверение № 180/11.01.2005 г.	25 г/л делтаметрин	0,03 %	листозавивачки; черешова муха; крушова листна бълха; ябълков плодов червей; ябълкова плодова оса; зелена ябълкова листна въшка	535	3 ягоди	3
			0,04 %	лозова пъстриянка по лоза; обикновена сливова щитоносна въшка; гроздови молци; източен плодов червей; листо- миниращи молци; бадемов семеяд		зелен- чуци на полето	при упо- тре- ба с ато- миза
			0,05 %	черна сливова плодова оса; сливов плодов червей; оранжерийна белокрылка по зеленчукови култури в оранжерии; листни въшки по хризантема		7 соя зелен- чуци в оранж	тор в скла- дове 1-ва
			20 мл/дка	цвеклови бълхи; грахова листна въшка по грах		ябълки зеле	
			20-30 мл/дка	колорадски бръмбар		тютюн	
			30 мл/дка	ларви на вредна житна дървеница		лозя	
			40 мл/дка	фасулев зърнояд; обикновена житна пиявица; маков листояд		кар- тофи	
			50 мл/дка	цвеклови щитовки (ларви); оранжерийна белокрылка по тютюн на полето; зелена прасковена листна въшка по пипер; агрилус по маслодайна роза; ясенев листов хоботник		14 ориз малини къпини люцер- на	
			50-70 мл/дка	зелева нощенка по зеле		30	
			50-80 мл/дка	тютюнев трипс по тютюн		бадем памук	
			60 мл/дка	неприятели по люцерната за семепро- изводство - до началото на цъфтеж		житни	
			100 мл/дка	сив царевичен хоботник; марокански и италиански скакалци		зах.	

			3 мл+12мл вода за 10 куб.м	дезинсекция на празни складове с/у складови неприятели - с атомизиращ електрически разпръсквач М 1026. Експозиция 48 ч.		цвекло, царе- вица	
			1 мл/м ² площ/ 0,5 до 1 л/м ² раб.р-р	за дезинсекция на празни складове срещу складови неприятели - третиране с тракторна пръскачка. Експозиция 48 ч.		60 слънч- оглед	
			1,4 мл+ 12 мл вода 140 мг/м ³ (р-р за 10 м ³ -	оризова и житна гъгрица, ръждиво-червен брашнен бръмбар, зърнов бръмбар, суринамски брашнояд - третиране с атомизиращ електрически разпръсквач М 1026. Експозиция 48 ч		не се налага при леца и фасул	
24.	ДЕЦИС 25 ВГ Байер КропСайанс -Удостоверение № 522/12.07.2007 г.	250 г/кг делтаметрин	0,003 % (3 г/дка)	ябълков плодов червей; черешова муха, приложен 8-10 дни след начало на летеж на мухите			
			0,004 % (4 г/дка)	шарен гроздов молец			
			7 г/дка.	зелева нощенка			
25.	ДЕЦИЯ-ГАЗ- ЕКС-Б торбички Деция Дегеш	57 % алуминиев фосфид		с/у: житна гъгрица, оризова гъгрица, малък зърнов бръмбар, брашнен бръмбар, зърнов молец, малък брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, мавритански брашнояд, сив брашнен молец, ръждиво-червен зърнов бръмбар, трогодерма при експозиция: 3 денонощия при t над 25° С; 4 денонощия при t 15-25° С; 7 денонощия при t 10-15° С; 14 денон. при t 5-10° С; при t под 5° С не се фумигира	9,12	30 зърно 60 брашно	1
			1 торбичка/ 2-6 т зърно	за третиране на зърно в силозни клетки			
			1 торбичка/ 1-3 т зърно	за третиране на зърно в плоски складове, трюмове, вагони			

				с/у: житна гъгрица, оризова гъгрица, малък зърнов бръмбар, брашнен бръмбар, зърнов молец, малък брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, мавритански брашнояд, сив брашнен молец, ръждивочервен зърнов бръмбар, трогодерма молец по сушените плодове, зърнов молец, тютюнев молец при експозиция: 3 денонощия при t над 25° C; 4 денонощия при t 15-25° C; 7 денонощия при t 10-15° C; 14 денонощия при t 5-10° C; при t под 5° C не се фумигира			
			1 торб./2-6 т или 1 торб./4-10 м ³	за третиране на обработени, пакетирани хранителни продукти в чували и фуражи - под полиетилен			
			1 торб./1-2 м ³	без полиетилен (третира се целият обем на помещението)			
			1 торб./5-10 м ³	за третиране на празни складове и мелници - обемна фумигация срещу: тютюнев бръмбар и тютюнев молец при експозиция: 4 денонощия при t над 20° C; 6 денонощия при t 15-25° C; 7 денонощия при t под 10-15° C.			
			2 торб./28 м ³	за третиране на тютюн в бали, каси, бъчви			
26.	ДЕЦИЯ-ГАЗ-ЕКС-Б-ФОРТЕ торбички Деция Дегеш	66 % магнезиев фосфид	9 г (1 торбичка)/ тон зърно	за обеззаразяване на зърно в силозни клетки срещу: оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар. Експозиция.: 3 денон. при t на зърното	9,12	30 зърно 60 брашно	1

				над 15°C; 4 денон. при t на зърното 5-12°C; до 15 денон. при t на зърното под 5°C. -за обеззаразяване на зърно в насипно състояние в складове с/у: оризова гърица, житна гърица, суринамски брашнояд, ръждивочервен брашнен бръмбар, ръждивочервен зърнов бръмбар, зърнов бръмбар. Експозиция: 3 денон. при t на зърното над 15°C; 4 денон. при t на зърното 5-12°C; до 15 денон. при t на зърното под 5°C			
			9 г (1 торбичка)/ 2 м ³	за обеззаразяване на празни складове и работни помещения с/у: оризова гърица, житна гърица, суринамски брашнояд, ръждивочервен брашнен бръмбар, ръждивочервен зърнов бръмбар, зърнов бръмбар. Експозиция: 3 денон. при t над 15°C; 4 денон. при t 5-12°C; до 15 денон. при t под 5°C			
			9 г (1 торбичка)/ 5 м ³	за обеззаразяване на складирани тютюни с/у тютюнев бръмбар и тютюнев молец. Експоз.: 3 денон. при t над 15°C; 4 денон. при t 5-12°C; до 15 денон. при t под 5°C			
			9 г (1 торбичка)/ тон	за обеззаразяване на стифирани продукти под полиетилен с/у: оризова гърица, житна гърица, суринамски брашнояд, ръждивочервен брашнен бръмбар, ръждивочервен зърнов бръмбар, зърнов бръмбар, сив брашнен молец, молец по сушените плодове, зърнов молец. Експозиция: 3 денон. при t над 15°C; 4 денон. при t 5-12°C; до 15 денон. при t под 5°C			

27.	ДИМИЛИН 25 ВП Кемтура -Удостоверение № 145/05.02.2004 г.	250 г/л дифлубензурон	0,04 %	ябълков плодов червей; подвижни форми и яйца на крушова листна бълха; източен плодов червей	4640	30 овощни	3
			0,05 %	кръгломиниращ молец; сливов плодов червей			
			0,05 % или 30 г/дка	малка тополова стъклена в тополови разсадници			
			10 г/дка	червеноглава борова листна оса			
			20 г/дка или 10 г/ка+ 100 г/дка Ело	борова процесия; гъботворка по дъб			
			50 г/дка	обикновена житна пиявица; синя житна пиявица			
			100 г/дка	агрилус по маслодайната роза - третира се 3-4 дни преди беритба			
28.	ДИМИЛИН 480 СК Кемтура -Удостоверение № 44/28.05.2003 г.	480 г/л дифлубензурон	0,04 %+0,02 % Акарзин	кестенов листоминиращ молец - в начало на летежа на пеперудите	4640	не се изи- сква	3
			10 мл+25 мл Паволин+ 265 мл вода-	гъботворка по дъб; борова процесия; ръждива борова листна оса (300 мл раб. р-р/дка за УЛВ)			
			5 мл+50 мл Акарзин	марокански и италиански скакалци			
			10 мл+50 мл Акарзин+ 240 мл вода, 300 мл р-р/дка	гъботворка, листозавивачки, педомерки и златозадка по горски видове (дъб и габър); борова процесия			
29.	ДУЕТ 530 ЕК /ТЕРАГАРД ПЛЮС/ Имаспро -Удостоверение № 30/05.01.2003 г.	50 г/л циперметрин 480 г/л хлорпирифос- етил	50 мл/дка	колорадски бръмбар	145	7 кар- тофи 28 житни	2
			70 мл/дка	обикновен житен бегач тютюнев трипс по тютюн			

30.	ДУРСБАН 4 ЕК Дау Агросайънсис -Удостоверение № 29/05.01.2003 г.	480 г/л хлорпирифос- етил	0,1 %	обикновена сливова щитоносна въшка; бяла американска пеперуда (гъсеници I и III възр.); листозавивачки по овощни култури	410	28	2
			0,1% (60-70 л/дка р-р)	сиви червеи			
			0,12 %	източен плодов червей			
			0,15 %	калифорнийска щитоносна въшка; анарзия и гъботворка по кайсия; сливов плодов червей; кръгломиниращ молец			
			0,2 %	ябълков плодов червей			
			60 мл/дка с 1,5 л/дка р-р	обикновена житна пиявица (самолетно третиране с дюзи тип дъждовна капка)			
			100 мл/дка	зелева нощенка по зеле, памукова листна въшка по памук, ипсилонова нощенка, зелева нощенка по зах. цвекло, вредна житна дървеница (ларви)			
			120 мл/дка с 1,5 л/дка р-р	цвеклови щитовки (самолетно пръскане с дюзи тип дъждовна капка)			
			120 мл/дка	рапичен цветояд, италиански и марокански скакалци			
			150 мл/дка	зелева нощенка по грах, царевичен стъблен пробивач (I покол.), обикновен житен бегач (ларви)			
			180 мл/дка	мъхнат бръмбар			
			200 мл/дка	цвеклови щитовки (ларви), цвеклови бълхи			
			240 мл/дка	сиви червеи в лозови вкоренилища			
250 мл/дка	цвеклов молец						
31.	ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК ЦАЙПЕР 10 ЕК/ Ефтимиадис	100 г/л циперметрин	0,04 %	ябълков плодов червей	251	7	3
			30 мл/дка	вредна житна дървеница; обикновена и синя житна пиявица			
			40 мл/дка	италиански скакалец			

32.	КАЛИПСО 480 СК Байер Кропсайанс -Удостоверение № 399/20.02.2007 г.	480 г/л тиаклоприд	0,02 % (20 мл/дка)	зелена ябълкова листна въшка	400	3 домати пипер краста- вици 14 ябълки череша 21 картофи 30 рапица	2
			10 мл/дка	колорадски бръмбар; рапичен цветояд - третира се една седмица от началото на бутонизация с 20-40 л/дка раб. р-р			
			20 мл/дка с 20-40 л/дка раб.р-р	зелена прасковена листна въшка по зеленчуци (пипер); ябълков плодов червей - 2 третираня през 10-12 дни; черешова муха по череша			
			30 мл/дка	тютюнева листна въшка по тютюн			
33.	КАРАТЕ ЗЕОН Синджента -Удостоверение № 188/13.01.2005 г.	50 г/л ламбда цихалотрин	0,02 %	шарен гроздов молец ябълков плодов червей	522	7 зеле 10 грозде 13 пасища ливади 14 ябълки 15 зах. цвекло 28 житни 30 люцерна 60 пьопон	3
			12,5 мл/дка	цвеклови бълхи			
			15 мл/дка	люцернов листояд; колорадски бръмбар; зелева ноценка по зеле; рапичен цветояд; вредна житна дървеница (ларви); обикновена житна пиявица			
			30 мл/дка	тютюнев трипс по тютюн, зелена прасковена листна въшка по тютюн			
			50 мл/дка	марокански и италиански скакалци			
34.	КАСКЕЙД 5 ЕК БАСФ Агро Б.В. -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 149/05.02.2004 г.	50 г/л флуфеноксурон	0,1 %	шарен гроздов молец	3000	30	3
			0,15 %	ябълков плодов червей; източен плодов червей; кръгломиниращ молец; сливов плодов червей			
			0,2 %	оранжерийна белокрилка (ларви)			

35.	КОНФИДОР 200 СЛ Байер Кропсайанс -Удостоверение № 288/22.02.2005 г.	200 г/л имидаклоприд	0,05 %	зелена прасковена листна въшка по зеленчуци (пипер); памукова листна въшка по зеленчуци (краставици)	2200	30 цвекло 14 тютюн 7 зеленчуци	3
			50 мл/дка	листни въшки по захарно цвекло			
			60 мл/дка	тютюнев трипс по тютюн			
36.	КОНФИДОР 70 ВГ Байер Кропсайанс -Удостоверение № 181/11.01.2005 г.	714,3 г/кг имидаклоприд	0,01 % (10 г/дка) 15 г/дка	ябълков кръгломинаращ молец тютюнев трипс по тютюн	2200	14	3
37.	КОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД Байер Кропсайанс -Удостоверение № 538/24.09.2007 г.	75 г/л имидаклоприд+ 10 г/л делтаметрин	0,06 % (60 мл/дка)	зелена прасковена листна въшка по зеленчуци; памукова листна въшка по зеленчуци	2200	3 зеленчуци 7 тютюн зеле	3
			0,08 % (80 мл/дка)	оранжерийна белокрилка по зеленчуци - домати и краставици			
			80 мл/дка	зелева нощенка; тютюнев трипс по тютюн			
38.	КОСМОС 500 ФС БАСФ Агро Б.В. -Удостоверение № 151/09.02.2004 г.	500 г/л фипронил	750 мл + 600 мл вода за 100 кг семена	сив царевичен хоботник по царевица, телени червеи по царевица, сив царевичен хоботник по слънчоглед, телени червеи по слънчоглед	290	-	1
39.	КОХИНОР 200 СЛ Мактешим Аган -Удостоверение № 343/13.03.2006 г.	200 г/л имидаклоприд	0,05 %	зелена прасковена листна въшка по зеленчуци (пипер); памукова листна въшка по зеленчуци (краставици)	2200	7 зеленчуци 14 тютюн 30 цвекло	3
			50 мл/дка	листни въшки по захарно цвекло			
			60 мл/дка	тютюнев трипс по тютюн			
40.	КРАЙЦЕР 350 ФС Синджента	350 г/л тиаметоксам	100 мл+200 мл вода/100 кг семе	обикновен и голям житен бегач	>3000	-	3
			800 мл/100 кг семе	сив царевичен хоботник по царевица, телени червеи по царевица			

	-Удостоверение № 551/18.06.2008		900 мл/100 кг семе	сив царевичен хоботник по слънчоглед, телени червеи по слънчоглед			
			2 л/100 кг семе или 24 мл/единица недражирани семена	цвеклови хоботници (обикновен цвеклов хоботник, сив цвеклов хоботник, сив царевичен хоботник)			
41.	КУИКФОС дражета/пелети Юнайтед Фосфоръс -Удостоверение № 152/09.02.2004 г.	57 % алуминиев фосфид	30 дражета (пелети)/тон зърно	за обеззаразяване на зърно в силозни клетки с/у: оризова и житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар, Palorus spp. Експозиция: 3 денон.при t на зърното над 20°C, 5 денон.при t на зърното 15-20°C, 7 денон. при t на зърното 10-15°C Забележка: Третирането да се извърши с автоматичен дозатор над редлера на силозната клетка. За празното пространство над зърното в силозната клетка да се дозира на повърхността по 1 табл./м ²	11,8 мг/куб.м. ЛК ₅₀	45 за зърно	1
42.	КУИКФОС овални таблетки Юнайтед Фосфоръс -Удостоверение № 66/21.06.2003 г	57 % алуминиев фосфид	10 табл./тон зърно	за обеззаразяване на зърно в насипно състояние с/у: оризова и житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар; Palorus spp. Експоз: 3 денонощия при t на зърното над 20°C; 5 денонощия при t 15-20°C, 7 денонощия при t 10-15°C. Третирането да се извършва чрез пригодени сонди за дозиране в купа, автоматичен дозатор над лентата или ръчно пускане. Купът след третирането да се покрие с полиетилен или гумиран брезент	11,8 мг/куб.м. ЛК ₅₀	45 за зърно	1

43.	ЛАМБАДА 5 ЕК Стоктон -Удостоверение № 4/23.01.2003 г.	50 г/л ламбда- цихалотрин	0,015 %	ябълков плодов червей	345	28	3
			12,5 мл/дка	вредна житна дървеница (ларви)			
			20 мл/дка	вредна житна дървеница (имаго)			
44.	ЛАРДЕКС 25 СК Неохим ЕООД -Краен срок за предлагане на пазара - 16.09.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните коли- чества - 16.09.2010 г.	250 г/л дифлубензурон	0,05 %	ябълков плодов червей (за I-во пръскане на I-во поколение)	>4640	30	3
			20 мл+50 мл Акарзин+230 мл вода (300 мл/дка раб. р-р за УЛВ)	листозавивачки и педомерки по дъб (зелена дъбова листозавивачка, кафява листозавивачка, малка зимна педомерка, голяма зимна педомерка); борова процессионка			
			50 мл/дка	колорадски бръмбар			
45.	МАВРИК 2 Ф Мактешим Аган -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 96/21.01.2004 г.	240 г/л тауфлувалинат	0,02 %	памукова листна въшка по краставици в оранжерии, зелена прасковена листна въшка по пипер в оранжерии	3000	7	3
			20 мл/дка	неприятели по люцерната за семе: ларви на педомерки; люцернов листожд			
				(възрастно); ларви на люцернов листов хоботник, пъпкова галица (възрастно); цветова галица (възрастно)			
			25 мл/дка	памукова листна въшка по краставици на открито; доматиена листна въшка по домати; листни въшки по захарно цвекло; вредна житна дървеница; обикновена житна пиявица			
			30 мл/дка	неприятели по люцерната за семе, грахова листна въшка; петниста листна въшка			

46.	МАГТОКСИН пелети/дражета Деция Дегеш -Удостоверение № 53/14.07.2003 г.	66 % магнезиев фосфид -1 пелета тежи 0,6 гр. и освобожава 0,2 гр. газ фосфин	30 пелети за 1 тон зърно	складови неприятели - оризова и житна гърица, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, зърнов бръмбар	0,18 мг/ м ³ за фосфо- рородо- рода ЛК ₅₀	30 зърно 60 брашно	1
47.	МАГТОКСИН плочки/ленти Деция Дегеш -Удостоверение № 153/09.02.2004 г.	56 % магнезиев фосфид	1 плоча на 25 куб.м.	за фумигация на складирани стоки, брашно в чували, фъстъци, билки, тютюн с/у: оризова гърица, житна гърица, ръждиво- червен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд. Експозиция 3 денонощия при t 25° С; 12 дененощия при t под 25°С	0,18 мг/ м ³ за фосфо- рородо- рода ЛК ₅₀	30 за зърно 60 за брашно	1
48.	МАЧО 600 ВС /ЧИТА/ Стоктон Кемикъл -Удостоверение № 557/19.06.2008 г.	600 г/кг имидаклоприд	70 г+100 мл вода/10 кг семе	майски бръмбар - третиране на семена от смърч	369	-	2
			700 г/100 кг семе	телени червеи по царевича			
			800 г/100 кг семе	сив царевичен хоботник по царевича			
49.	МЕЗУРОЛ ШНЕКЕНКОРН 4 Г Байер Кропсайанс	4 % метиокарб	250 г/дка	попово прасе - приложен площно (при разсади) и редово от двете страни на растенията (при останалите култури)	500	15	3
50.	МЕТАБРОМ Бромайн Компаундс -Краен срок за предлагане на пазара - 18.03.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 18.03.2010 г. -Удостоверение № 273/13.05.2005 г.	98 % метилбромид+ 2 % хлорпикрин	50-100 г/м ³ в зависимост от неприятеля	Разрешава се за използване в ограничени количества, само за карантина и обработка на пратки. Забележка: Забранява се използването на Метабром за третиране на празни помеще- ния, зърно в силосни клетки и складове със зърно и почви	1175 мг/ куб.м	20	1

51.	МИМИК 240 ЛВ Дау Агросайънсис -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 159/05.01.2005 г.	240 г/л тебуфенозид	0,04 %	бяла американска пеперуда	5000	21	3
			40 мл+ 160 мл вода, 200 мл/дка р-р за УЛВ	дъбова процесия; гъботворка, листо-завивачки, педомерки и златозадка по горски видове (дъб); борова процесия; ръждива борова листна оса			
52.	МОКАП 10 Г Байер Кропсайанс -Удостоверение № 286/04.02.2005 г.	100 г/кг етопрофос	4 кг/дка	телени червеи	62	14	1
53.	МОСПИЛАН 20 СП Нипон Сода -Удостоверение № 544/18.10.2007 г.	200 г/кг ацетамиприд	0,0125 %	памукова листна въшка по зеленчуци (краставици), зелена прасковена листна въшка по зеленчуци (пипер)	146	3 зеленчуци 10 тютюн	2
			0,02 %	оранжерийна белокрылка по зеленчуци (домати)			
			6 г/дка	колорадски бръмбар			
			10 г/дка	сив царевичен хоботник по царевица, сив царевичен хоботник по слънчоглед			
			12,5 г/дка	вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица, обикновен житен бегач			
			15 г/дка	зелена прасковена листна въшка по тютюн, тютюнев трипс по тютюн; листни въшки по житни култури; житни мухи: хесенска муха шведска муха			
			15 г/дка - с 3 л/дка раб. р-р	тополов листожд; ръждива борова листна оса			

			25 г/дка	цикада (<i>Hialestis obsoletus</i>) в по зеленчуци /пипер/			
			30 г/дка	тютюнева листна въшка по тютюн			
54.	НЕКСИД 015 КС Хеминова -Удостоверение № 325/09.01.2006 г.	15 г/л гама- цихалотрин	0,02 % (20 мл/дка)	памукова листна въшка по зеленчуци; зелена прасковена листна въшка по зеленчуци; тютюнева листна въшка по пипер	>5000	7 прас- кови; череша зеле кроста- вици 10 грозде 14 ябълки круши 21 карто- фи; 28 житни 30 лю- церна 13 св. площи	3
			0,03 % (30 мл/дка)	ябълков плодов червей; източен плодов червей; черешова муха; шарен гроздов молец; неприятел по люцерна: люцернов листояд и малък люцернов хоботник			
			0,04 % (40 мл/дка)	ябълков кръгломиниращ молец; оранжерийна белокрылка;			
			30 мл/дка	обикновена житна пиявица; колорадски бръмбар			
			40 мл/дка 60-100 мл/дка	зелева ноценка по зеле марокански и италиански скакалци Заб.: високата доза да се използва при каламтитет и смесени популации			
55.	НОМОЛТ 15 ЕК БАСФ Агро Б.В. -Удостоверение № 522/05.03.2008 г.	150 г/л тефлубензурон	0,05 %	ябълков плодов червей; гроздови молци; кръгломиниращ молец	5000	30 ово- щни 14 зе- лен- чуци	3
			0,075 %	източен плодов червей			
			0,1 %	крушова листна бълха			
			15 мл/дка	колорадски бръмбар			
			25 мл/дка	червеноглава борова листна оса			
			30 мл/дка	лъжегъсеници на ръждива борова листна оса; зелева ноценка по зеле, зелева ноценка по карфиол, зелев молец			
56.	НУРЕЛЕ ДУРСБАН	50 г/л циперметрин +	0,04 %	ябълкова плодова оса (срещу лъже- гъсеницата)	250	28	2

	/НУРЕЛЕ Д/ Агрифар -Удостоверение № 550/12.06.2008 г.	500 г/л хлорпирифос - етил	0,05 %	ябълков плодов червей; гъботворка по кайсия; малка зимна педомерка, голяма зимна педомерка, розена листозавивачка, глогова листозавивачка, кафявопетниста листозавивачка; пръстенотворка; анарзия по кайсия; калифорнийска щитоносна въшка; гроздови молци; обикновена сливова щитоносна въшка; хмелова листна въшка по хмел			
			0,06 %	кръгломиниращ молец по овощни; филоксера по лоза; мъхнат бръмбар			
			0,07 %	бадемов семеяд			
			0,075	млади ларви на лозова щитовка			
			0,08 %	вишнев хоботник			
			0,1 %	оранжерийна белокрилка			
			50 мл/дка	цвеклови бълхи, листни въшки по памук; тютюнев трипс по памук, колорадски бръмбар (ларви), вредна житна дървеница (ларви), обикновена житна пиявица			
			60 мл/дка	рапичен цветояд по рапица			
			70 мл/дка	царевичен пробивач; зелена нощенка по зах. цвекло; зелена нощенка по тютюн; тютюнев трипс по тютюн, обикновен житен бегач			
			75 мл/дка	италиански и марокански скакалци; житни мухи (хесенска и шведска)			
			80 мл/дка	мъхнат бръмбар по рапица			
			250 мл/дка	обикновен цвеклов хоботник			
57.	ПАРА ЗОМЕР Щелер -Удостоверение № 340/24.11.2005 г.	75 % парафи- ново масло	2 %	калифорнийска щитоносна въшка (за зимно пръскане)	>2000	-	3
			3 %	червен овощен акар			

58.	ПИКАДОР 20 СЛ Имаспро -Удостоверение № 89/16.06.2004 г.	200 г/л имидаклоприд	0,05 %	зелена прасковена листна въшка по зеленчуци (пипер); миниращи мухи по зеленчуци (домати и краставици) - в начало на легез на мухите	>2000	7 пипер 14 тютюн	3
			50 мл/дка	тютюнева листна въшка по тютюн			
			60 мл/дка	тютюнев трипс по тютюн			
59.	ПИКАДОР®20 СЛ /НУПРИД 200 СЛ/ НюФарм САС -Удостоверение № 562/09.09.2008 г.	200 г/л имидаклоприд	0,05 %	памукова листна въшка по краставици	>2000	-	3
60.	ПИКАДОР 35 СТ Имаспро -Удостоверение № 14/23.01.2003 г.	350 г/л имидаклоприд	120 мл/10 кг семе	майски бръмбар - третиране на семена от смърч	>2000	-	3
			1,2 л/100 кг семе	телени червеи по царевица			
61.	ПИКУС 60 ФС Хеминова -Удостоверение № 514/12.07.2007 г.	600 г/л имидаклоприд	800 мл/100 кг семена	телени червеи по царевица; сив царевичен хоботник по царевица	>200 <2000	-	2
			1л/100 кг семена	телени червеи по слънчоглед; сив царевичен хоботник по слънчоглед			
62.	ПИЛОТ 480 ЕК Агрия АД -Удостоверение № 501/05.01.2007 г.	480 г/л хлорпирифос- етил	100 мл/дка	зелева нощенка по зеле	90	28	2
63.	ПИРИНЕКС 48 ЕК Мактешим Аган -Удостоверение № 255/07.01.2005 г.	480 г/л хлорпирифос- етил	0,12 %	ябълков плодов червей	280	28	2
			0,15 %	калифорнийска и обикновена сливова щитоносна въшка; сливов плодов червей			
			80 мл/дка	обикновена житна пиявица (ларви)			
			100 мл/дка	вредна житна дървеница; памукова листна въшка по памук, тютюнев трипс по памук; зелева нощенка по захарно цвекло; обикновена житна пиявица (възрастна)			
			150 мл/дка	царевичен стъблен пробивач; обикновен житен бегач			

			200 мл/дка	цвеклови бълхи, цвеклови щитовки (ларви) по зах.цвекло, колорадски бръмбар			
			250 мл/дка	цвеклов молец			
64.	ПОНЧО 600 ФС Байер КрокСайанс	600 г/л клотианидин	0,83 мл/1000 семена	за третиране на семена от царевица срещу телени червеи	>5000	-	1
65.	ПРОТЕУС 110 ОД Байер КрокСайанс	100 г/л тиаклоприд+ 10 г/л делтаметрин	40 мл/дка 45 мл/дка 70 мл/дка	колорадски бръмбар рапичен цветояд сив царевичен хоботник по царевица		21 картофи 30 житни царевица 45 рапица	3
66.	РАНЕР 240 СК Дау Агросайънсис -Удостоверение № 158/05.01.2005 г.	240 г/л метокси- фенозид	0,03 % 0,04 % 40 мл/дка	източен плодов червей; сливов плодов червей листозавивачки и педомерки по овощните култури: червена пъпкозавивачка; сива пъпкозавивачка; ябълков плодов червей - двукратно третиране през 14 дни; шарен гроздов молец - двукратно третиране през 14 дни зелева ношенка по зеле; зелев молец	>5000	7 грозде трапезно сливи 14 грозде винено ябълки зеле	3
67.	РЕЛДАН 40 ЕК Дау Агросайънсис -Удостоверение № 251/05.01.2005 г.	400 г/л хлорпирифос- метил	0,12 % 120 мл/дка 4 см ³ +12 см ³ вода за 10 м ³ празно пространство 0,25 % при разход на работен р-р 0,5 л/кв.м	ябълков плодов червей; шарен гроздов молец вредна житна дървеница; марокански скакалец; тютюнев трипс и зелена прасковена листна въшка по тютюн третиране на празни складови помещения с/у: оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд (третиране с ела.аерозолен разпръсквач М 1026) третиране на празни складове с/у: оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд (с тракторна пръскачка)	2140	14 овощни 28 житни	3 за трет. на складо ве 1 ка- тего рия

68.	САНМАИТ 20 ВП Нисан кемикъл -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 217/25.10.2004 г.	200 г/кг пиридабен	0,075 %	памукова листна въшка по зеленчуци (краставици), оранжерийна белокрылка по зеленчуци (домати)	3185	7	2
69.	СЕМАФОР 20 СТ ФМС Краен срок за предлагане на пазара - 30.05.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 30.05.2011 г. -Удостоверение № 514/18.10.2007 г.	200 г/л бифентрин	300 мл/100 кг семена	телени червеи по цвекло	536	90	2
			350 мл+750 мл вода/ 100 кг семена	сив царевичен хоботник по царевица и слънчоглед; телени червеи по слънчоглед			
			500 мл+ 1 л вода/ 100 кг семена	тютюнев трипс по памук			
70.	СИЙДОПРИД 600 ФС Мактешим Аган	600 г/л имидаклоприд	700 мл/100 кг семена	телени червеи (сем. Elateridae), за третиране на семена при царевица		-	1
			800 мл/100 кг семена, 1000 мл/100 кг семена,	сив царевичен хоботник за третиране на семена при царевица телени червеи (сем. Elateridae) и сив царевичен хоботник за третиране на семена при слънчоглед			
71.	СИПЕРВЕТ 25 ЕК Ветерин	250 г/л циперметрин	0,02 %	ябълков плодов червей	256	7	3
			10 мл/дка	колорадски бръмбар			
72.	СНЕЙК 20 СП Имаспро -Удостоверение № 193/17.01.2005 г.	200 г/кг ацетамиприд	0,0125 %	листни въшки по пипер (зелена прасковена, Aphis nasturtii); памукова листна въшка по краставици	1390	3	2

73.	СУМИ АЛФА 5 ЕК Сумитомо кемикъл -Удостоверение № 157/10.02.2004 г.	50 г/л есфенвалерат	0,02 %	ябълков плодов червей; източен плодов червей; кръгломиниращ молец; листни въшки по хризантема; зелена прасковена листна въшка по пипер в оранжерии; памукова листна въшка по краставици в оранжерии; листозавивачки и педомерки по овощни: червена пъпкозавивачка, малка зимна педомерка, сива пъпкозавивачка; анарзия по кайсия; черна сливова плодова оса; сливов плодов червей	325	14	3
			0,025 %	шарен гроздов молец			
			0,03 %	крушова листна бълха			
			15 мл/дка	колорадски бръмбар по картофи			
			20 мл/дка	маков листояд; зелена прасковена листна въшка по пипер на открито; неприятели по люцерната за семе: грахова листна въшка, петниста листна въшка, ларви на педомерки, люцернов листояд (възрастно), люцернов листов хоботник (ларви), пъпкова галица (възрастно), цветова галица (възр.)			
			25 мл/дка	вредна житна дървеница; обикновина житна пиявица; цвеклови бълхи; зелена нощенка и зелев молец по зеле; грахов зърнояд по грах; ливадна пеперуда (гъсеници II-III възр.)			
			30 мл/дка	ливадна пеперуда - гъсеници IV и V възр.			
			40 мл/дка	зелева нощенка по захарно цвекло, италиански и марокански скакалци			
			50 мл/дка	тютюнев трипс по тютюн			
			80 мл/дка	зелева прасковена листна въшка по тютюн			

74.	СУПЕРСЕКТ 10 ЕК Агрифар -Краен срок за предлагане на пазара -30.06.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 30.06.2010 г. -Удостоверение № 200/29.09.2004 г.	100 г/л циперметрин /цис-транс 80:20/	0,0125 %	ябълков и източен плодов червей; анарзия по кайсия; черешова муха; бяла американска пеперуда	251	7 пипер крас- тавици 14 ябълки череша круши грозде житни карто- фи 21 цвекло 28 лива- дни	3
			0,015 %	кръгломиниращ молец; крушова листна бълха			
			0,02 %	гроздови молци			
			0,03 %	зелена прасковена листна въшка по пипер в оранжерии; памукова и зелена прасковена листна въшка по краставици в оранжерии			
			12,5 мл/дка	житна пиявица, цвеклови бълхи, цвеклови щитовки, зелена нощенка по захарно цвекло, колорадски бръмбар			
			15 мл/дка	вредна житна дървеница; ливадна пеперуда (гъсеници II и III възраст)			
			20 мл/дка	ливадна пеперуда (гъсеници IV и V възраст)			
			30 мл/дка	зелена прасковена листна въшка по пипер на открито			
40 мл/дка	тютюнев трипс, зелена прасковена листна въшка по тютюн						
75.	СУПЕРСЕКТ МЕГА Агрифар СА Удостоверение № 0545/02.12.2008 г.	250 г/л циперметрин	0,015 %	ябълков плодов червей	>2000	7	3
			0,03 %	кръгломиниращ молец			
			12 мл/дка	вредна житна дървеница; обикновена житна пиявица			
			25 мл/дка	зелева нощенка по зеле			
76.	ТАЛСТАР 10 ЕК ФМС Краен срок за предлагане на пазара -	100 г/л бифентрин	0,0125 %	черешова муха	531	14 за овощ ни 7 за	2
			0,02 %	шарен гроздов молец; анарзия по кайсия			
			0,025 %	гамозначна нощенка по хризантема и гербера			

	30.05.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 30.05.2011 г. -Удостоверение № 545/02.12.2008 г.		0,03 %	ябълков плодов червей; кръгломиниращ молец; сливов плодов червей; обикновена сливова щитоносна въшка (за лятна борба срещу ларви); тютюнев трипс по хризантема, гербера и краставици; хмелова листна въшка по хмел, листоминиращи мухи по зеленчуци (домати, фасул) за лятна борба срещу имагото		зеленчуци	
			10 мл/дка	обикновена житна пиявица			
			15 мл/дка	цвеклови щитовки, вредна житна дървеница, ливадна пеперуда - гъсеници II и III възраст			
			15-20 мл/дка	неприятели по люцерната за семеизводство: грахова и петниста листни въшки, педомерки (ларви), люцернов листояд (възрастно), люцернов листов хоботник (ларви), пъпкова галица (възрастно), цветова галица (възрастно)			
			20 мл/дка	ливадна пеперуда (гъсеници IV и V възраст), зелева ноценка по захарно цвекло, листни въшки по пипер, зелена прасковена листна въшка по тютюн, оранжерийна белокрилка по тютюн			
			30 мл/дка	царевичен стъблен пробивач, тютюнев трипс по тютюн			
77.	ТЕКФОС таблетки Делиция Фрайберг -Удостоверение № 411/25.01.2007 г.	57 % алуминиев фосфид	1,5 табл./м ²	тютюнев бръмбар, тютюнев молец (третиране на тютюн под полиетилен)	11,8	45	1
			10 табл./тон зърно	третиране на зърно в насипно състояние срещу: оризова и житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар.Експоз.: 3 денон.			

				при t° над 20°C; 5 денон. при t° 15-20°C; 7 денон. при t° 10-15°C. Забележка: Третирането да се извърши с тръбна сонда с капаче за сондиране на зърно с дължина 2,5-3 м. Купът със зърното да се покрие с полиетилен след зареждане с продукта			
78.	ТЕКФОС пелети Делиция Фрайберг -Удостоверение № 385/25.01.2007 г.	57 % алуминиев фосфид (1 пелета=0,6 г)	7,5 бр. пелети/1м ³	тютюнев бръмбар и тютюнев молец при тютюн под полиетилен	11,8	45	1
			50 бр. пелети/тон зърно	оризова гърица, житна гърица, суринамски брашнояд, ръждивочервен брашнен бръмбар, ръждивочервен зърнов бръмбар, зърнов бръмбар. Експоз.: 3 денон. при t° на зърното над 20°C; 5 денон. при t° на зърното при 15-20°C; 7 денон. при t° на зърното при 10-15°C. Забележка: третирането се извършва с тръбна сонда с фуния с дължина до 2,5-3 м. Купът със зърното се покрива с полиетилен след зареждане с препарата.			
79.	ТЕРАГАРД 48 ЕК Гарда кемикъл -Удостоверение № 203/06.10.2004 г.	480 г/кг хлорпирифос- етил	0,1 %	листоазавивачки и педомерки по овощни култури: червена и сива пъпкозавивачки, малка зимна педомерка	130	28	2
			0,12 %	източен плодов червей			
			100 мл/дка	памукова листна въшка по памук, тютюнев трипс по памук			
80.	ТЕРАГАРД ПЛЮС Гарда кемикъл -Краен срок за предлагане на	480 г/л - хлорпирифос- етил+ 50 г/л циперметрин	0,05 %	калифорнийска щитоносна въшка	130	28	2
			50 мл/дка	колорадски бръмбар; вредна житна дървеница; обикновена житна пиявица			
			70 мл/дка	обикновен житен бегач; голям житен бегач			

	пазара -30.10.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 30.10.2010 г. -Удостоверение № 52/14.07.2003 г.		250 мл/дка	цвеклови хоботници: обикновен цвеклов, сив царевичен, сив цвеклов; сив царевичен хоботник по царевица			
81.	ТРЕБОН Митсуи Кемикъл -Удостоверение № 500/05.06.2007 г.	300 г/л етофенпрокс	0,065 %	зелена прасковена листна въшка по зеленчуци (пипер); памукова листна въшка по краставици (краставици)	5000	14	3
82.	ТРИГАРД 75 ВП Синджента -Удостоверение № 19/10.04.2003 г.	750 г/кг циромазин	0,6 г/ кв.м	гъбна муха - внася се с поставяне на торовата покривката (при предварителното и навлажняване) или при първата поливка (прибавя се към поливната вода)	5000	14 за гъби 4-домати 7-фасул	3
			0,02 %	миниращи мухи по зеленчуци (домати и фасул)			
83.	УОРАНТ 20 СЛ Хеминова -Удостоверение № 515/12.07.2007 г.	200 г/л имидаклоприд	0,05 % (50 мл/дка)	зелена прасковена листна въшка по зеленчуци памукова листна въшка по зеленчуци	>2000	7 пипер краставици 14 тютюн	3
			50 мл/дка.	тютюнев трипс по тютюн			
84.	УОРАНТ 70 ВГ Хеминова -Удостоверение № 516/12.07.2007 г.	700 г/кг имидаклоприд	15 г/дка.	тютюнев трипс по тютюн	>2000	15	2
85.	ФЕНДОНА 60 СК БАСФ Агро Б.В.. -Удостоверение № 306/11.05.2005 г.	60 г/л алфа-циперметрин	2 см ³ +12 см ³ вода за 10 м ³ празно пространство	за третиране на празни складови помещения с/у: житна гъгрица, оризова гъгрица, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд -	>2000	1	2

				третиране с електрически аерозолен генератор за студен аерозол М 1026			
			45 мг/м ² а.в (0,15 %) при разход 0,5 л/м ² раб.р-р	за третиране на празни складови помещения срещу: житна гърица, оризова гърица, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд - третиране с тракторна пръскачка			
86.	ФОРЕСТЪР 48 СК Имаспро -Краен срок за предлагане на пазара -16.09.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 16.09.2010 г. -Удостоверение № 250/11.03.2005 г.	480 г/л дифлубензурон (а.в.Форвард)	10 мл+50 мл Акарзин+240 мл вода/дка, 300 мл р-р/дка	златозадка по горски видове; борова процесия; гъботворка по горски видове	>2000	30	3
			10 мл+50 мл Масло РЗ+ 240 мл вода/дка, 300 мл р-р/дка	борова процесия			
87.	ФОРЕСТЪР® 48 СК Агрия АД -Краен срок за предлагане на пазара - 16.09.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 16.09.2010 г. -Удостоверение № 249/11.03.2005 г.	480 г/л дифлубензурон (а.в.Форвард)	5 мл/дка+ 50 мл/дка Акарзин	марокански и италиански скакалци	>2000	30	3
			10 мл+50 мл Акарзин+ 240 мл вода/дка, 300 мл р-р/дка	листоазавивачки и педомерки по горски видове; ръждива борова листна оса; гъботворка по горски видове			

88.	ФОСТОКСИН таблетки Деция Дегеш -Удостоверение № 160/16.03.2004 г.	56 % алуминиев фосфид	10 табл./тон зърно	за третиране на зърно в насипно състояние срещу: оризова и житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръм- бар, суринамски брашнояд, ръждиво- червен зърнов бръмбар. Експозиция: 3 денонощия при темпера- тура над 20°C; 5 денонощия при температура 15-20°C; 7 денонощия при температура 10-15°C. Забележка: Третира се с тръбна сонда с капаче за сондиране на зърно с дължина 2,5-3 м. Купът със зърното да се покрие с полиетилен след зареждане с продукта	11,8	45 за зърно 60 за браш- но	1
			2 табл./м ³	третиране на складирано брашно в чували			
89.	ФОСТОКСИН пелети Деция Дегеш -Удостоверение № 203/21.01.2005 г.	56 % алуминиев фосфид	4-12 пелети за тон зърно или 10-20 пелети/тон	срещу: житна гъгрица, оризова гъгрица, малък зърнов бръмбар, брашнен бръмбар, зърнов молец, малък брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, мавритански брашнояд, сив брашнен молец, ръждиво- червен зърнов бръмбар, трогодерма. Експозиция: 2 денонощия при t над 20° C; 3 денон. при t 16-20° C; 4 денон. при t под 12-15° C; 8 денон. при t под 5-11° C; при t под 5° C не се фумигира за третиране на зърно в силосни клетки, вносяни с автоматичен дозатор в момента на насипване на зърното при ръчно залагане	11,8	45 за зърно 60 за браш- но	1
			5-10 пелети/м ³	за третиране на стифирано в чували зърно срещу: житна гъгрица, оризова гъгрица, малък зърнов бръмбар, брашнен бръмбар,			

				зърнов молец, малък брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, мавритански брашнояд, сив брашнен молец, ръждиво-червен зърнов бръмбар, трогодерма, молец по сушените плодове, зърнов молец, тютюнев молец. Експозиция: 2 денонощия при температура над 20° С; 3 денонощия при температура 16-20° С; 4 денонощия при температура под 12-15° С; 8 денонощия при t под 5-11° С; при температура под 5° С не се фумигира			
			5-15 пелети м ³	за третиране на обработени, пакетирани хранителни продукти и фуражи			
			10-15 пелети м ³	за третиране на празни складове и мелници - обемна фумигация			
			2,5-5 пелети/м ³	за третиране на тютюн в бали, каси, бъчви в доза; срещу: тютюнев бръмбар и тютюнев молец. Експозиция: 2 денонощия при температура над 20° С; 3 денонощия при температура 16-20° С; 4 денонощия при температура под 12-15° С; 8 денонощия при температура под 5-11° С; при температура под 5° С не се фумигира			
90.	ФЮРИ 10 ЕК ФМС -Удостоверение № 257/250701.2005 г.	100 г/л зета-циперметрин	0,0125 %	ябълков плодов червей; шарен гроздов молец, черешова муха	385	1	3
			0,015 %	памукова листна въшка по зеленчуци (краставици); калифорнийски трипс по зеленчуци			
			0,02 %	оранжерийна белокрилка			
			7,5 мл/дка	вредна житна дървеница (ларви), обикновена житна пиявица			

			10 мл/дка	колорадски бръмбар; зелева нощенка по зеле; вредна житна дървеница (възрастно)			
			15 мл/дка	тютюнев трипс по тютюн			
91.	ЦИКЛОН 10 ЕК Юнайтед фосфоръс -Удостоверение № 56/21.07.2003 г.	100 г/л циперметрин	0,015 %	шарен гроздов молец; черешова муха	2510	7	3
			0,02 %	ябълков и източен плодов червей			
			15 мл/дка	вредна житна дървеница; обикновена житна пиявица			
92.	ЦИПЕРКАЛ 100 ЕК Ариста Лайфсайънс -Краен срок за предлагане на пазара - 16.12.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 16.12.2010 г. -Удостоверение № 346/01.12.2005 г.	100 г/л циперметрин	0,015 %	шарен гроздов молец	>2000	7	3
			15 мл/дка	вредна житна дървеница			
			25 мл/дка	колорадски бръмбар			
93.	ЦИПЕРФОС 530 ЕК Ариста Лайфсайънс -Краен срок за предлагане на пазара - 16.12.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 16.12.2010 г. -Удостоверение № 345/01.12.2005 г.	480 г/л хлорпирифос-етил+ 50 г/л циперметрин	0,05 %	шарен гроздов молец; калифорнийска щитоносна въшка	270	28 лозя, житни и ово- щни	2
			50 мл/дка	вредна житна дървеница; обикновена житна пиявица; колорадски бръмбар			
			70 мл/дка	обикновен житен бегач			